

新編醫學正傳

醫學正傳卷之六目錄

便濁門 五十六 論

脉法 丹溪方法凡十九條

治便濁丸藥方

二陳加升提藥方 珍珠粉丸

半苓丸

靈房便濁方 張子元氣血兩虛

燥濕痰白濁方

妙香散 秘真丸

華蘅分清散

治濁固本丸 九龍丹

水陸二仙丹

定志珍珠粉丸 丹溪活套

祖傳經驗秘真丹

已試醫驗一條

○淋門 五十七 附關格

論 脉法 丹溪方法凡九條

參苓琥珀湯

琥珀散 傷寒後脫陽方

老人氣虛淋閉方

小便黃澁方 下焦無血小便澁方

通關丸 即沙腎丸

清肺飲子 導氣除燥湯

腎疸湯

小薊湯

八正散

牛膝膏

茯苓湯

倒換散

葵子散

濟生葵子湯

琥珀散

鐵部丸

廣濟維蘇飲子

又方治小便不通

集驗治小便淋瀝方

石常散

祖傳經驗方

治小便溺血方

又治溺血方

治沙淋墜痛方

孕婦轉胞方

又治血淋方

附可溪閑格方法

九三條

祖傳經驗方

閑格雜經法語

已試醫驗一條

○秘結門

五十八

論

脉法

丹溪方法

九二條

脾約丸

通幽湯

潤燥湯

潤腸丸

麻黃白朮湯

升陽瀉熱湯

活血潤燥丸

潤腸湯

潤體丸

備急大黃丸

枳殼丸

枳實導滯丸

已試醫驗二條

○黃疸門

五十九

論

脉法

卅溪方法五條

治黃疸方

又治氣實黃疸方

小溫中丸

大溫中丸

調胃承氣湯

治黃疸法語凡四條

大黃栢梔芒硝湯

又治疸法語凡四條

硝石礬石散

治酒疸方

茯苓湯

治穀疸方

胃苓湯

腎疸湯

茵陳五苓散

茵陳茯苓湯

梔子大黃湯

半溫半熱湯

茵陳蒿湯

茵陳大黃湯

梔子栢皮湯

茯苓滲濕湯

小茵陳湯

茵陳四逆湯

導滯苦參散

當歸白朮湯

抵當湯凡傷寒門

針砂丸

綠礬丸

棗礬丸

祖傳經驗退金丸

已試醫驗一條

○瘡瘍門六十

論脉法

丹溪方法九二十二條

取刺骨方

升陽益胃散治骨疽

當歸羌活湯治腦疽

棋榔散欬瘡口

千金托裏散治骨疽

丹溪治背疽方

丹溪治附骨疽法

羌活防己湯治附骨疽

托裏黃芪酒煎湯

焚連消毒飲治附骨疽

黃芪柴胡湯治附骨疽

丹溪治腎癰方法

內托羌活湯

治腎癰

丹溪治內疽方法

丹溪治肺癰方法

又治肺癰方法

黃昏湯治肺癰

葶藶大棗瀉肺湯

葶藶湯

治肺癰

桔梗湯治肺癰

又治肺癰方

又治肺癰方法一條

吐膿血如肺癰方丹溪治腸癰方法

千金論腸癰法語

要畧治腸癰方

腸癰灸法

薏苡附子敗醬散

大黃牡丹湯

已試醫驗一條

丹溪治乳梗方法

治乳癰方

又治乳癰方法

升麻托裏湯

程石香治妳岩法

十六味流氣飲

單煮青皮湯

橘葉散

丁香散

治妳頭皸裂

丹溪治囊癰方法

野紫蘇治囊癰方

丹溪治便毒方法

又治便毒方

又便毒成膿方

石香程氏便毒方法

蘇方木散

治便毒

玉燭散

治便毒

牡蛎大黃湯治便毒

丹溪治瘰癧方法

又治瘰癧方法

又丹溪治瘰癧法

治血少馬刀瘡方

程石香論治瘰方法

蟾酥膏治瘰

綠雲膏

治瘰

金寶膏

治瘰

龍珠膏

治瘰

救苦化堅湯

柴胡連翹湯

消腫湯

柴胡通經湯

散腫潰堅湯

升陽調經湯

連翹散堅湯

龍泉散

三聖丸

立驗大聖散

玉屑妙靈散

六丁神散呈于方俱

濟生破結散治癰

南星散治瘡

又治瘡方法

龍珠膏見前條

流氣飲見前條

丹溪治瘦氣方法

丹溪治結核方法

又治臂核方

耳後頂門有核方法

程石香論疔腫方法

返龜丹

拔疔法

奪命丹 雄黃丸

化毒丸 獨蟾丸

雄射湯 二活散

取六散

解毒丸

賀藍先生解毒丸

萬病解毒丸

千金漏蘆湯

取疔腫方

破毒散

灸疔腫法

祖傳經驗秘方

活龜丹治惡瘡

治諸惡瘡方

又治諸惡瘡方

又治惡瘡方

天泡瘡方凡二

脚上沙瘡方

裏外膿瘡方

九四條

桃花散

生肌長肉

火燒湯泡瘡方

又治火燒湯泡瘡方

下疳瘡方

條

二頭瘡方

金絲瘡方

手痂瘡方

沙瘡方

瘡痛不可忍方

疥瘡方

白癩風癰方

風疥瘡方

癰瘡方

身虛痒方

又通身虛痒方

秘傳一擦光方

又治疥瘡及癩頭方

五香連翹湯

內托復煎散

白芷升麻湯

托裏散

又托裏散

烏金散

黃芪六一湯

治一切瘡癰方

內托護心散

小五香湯

復元通氣散

金銀白芷散

正鐵穰散

大鉄穰散

三消散

雲母膏

太乙膏

神異膏

祖傳萬槌青雲膏 又經驗治癰腫方 稀荃散

又治諸般癰腫神効方

○癰風門六十二

論

脉法

丹溪方法凡五條

換肌散

醉仙散

通天再造散

愈風丹

一家治癰疾法

又一家治癰疾法

又治手指掣曲法

加減通聖散

神仙紫花丸

治跌撲傷損方

治骨損方

元戎接骨丹

論治傷宜補氣血

治金瘡方

又治金瘡方

治損傷腹痛方

當歸導滯湯

雞鳴散

沒藥乳香散

校丹膏藥方

河間沒藥散

○破傷風門六十二

論脉法

丹溪方法一條

羌活防風湯

白木防風湯

小芎黃湯

大芎黃湯

發表雄黃散

大蜈蚣散

大羌活湯

防風湯治破傷風

小蜈蚣散

左龍丸

小羌活湯

養血當歸地黃湯

雄黃散治表藥

地榆防風散

白朮湯

二鰾丸

祖傳經驗秘方

附翻花瘡

醫學正傳卷之六目錄終

醫學正傳

卷之六

八

五

新編醫學正傳卷之六

花溪恒德老人盧椿天民編集

姪孫虞守愚惟明校正

便濁遺精五十六

論

內經曰諸轉反戾水液渾濁皆屬於熱夫便濁之証因脾胃之濕熱下流滲入膀胱故使便溲或白或赤而渾濁不清也原病式曰如夏月天氣熱甚則水液渾濁林木流津是也血虛而熱甚者則為赤濁此心與小腸主病屬火故也氣虛而熱微者則為白濁肺與大腸主病屬金故也丹溪曰大率多是濕痰流注宜燥中宮之濕又曰治宜燥濕降火兼升舉之法此皆至要之語也外有遺精滑泄之候與濁相類不可一

例而推夫遺精者多夢與鬼交而泄名曰夢遺或隨洩弱而出謂之精滑亦有思想無窮所頭不逐而得之者治宜安心神以降火又有因好色太過房勞致虛而得之者治法宜滋水藏以復真陰是皆千古不易之定論也學者詳之

脉法

兩尺脉洪數必便濁失精

女人尺脉濇而弱者或洪數而促者皆爲便濁白帶

心脉短小因心虛所致必遺精便濁

方法

丹溪方法凡十九條

丹溪曰便濁屬濕熱有痰有震赤屬血由小腸屬火故也

白屬氣由大腸屬金故也

○大率皆是濕痰流注宜燥中宮之濕赤者乃是濕傷血

○胃中濁氣下流滲入膀胱

○肥白人多痰

○治宜燥濕降火兼升提之大法二陳湯加二木升柴赤芍加
白芍藥煎服

○一八便濁嘗有半年或時夢遺形瘦作心虛主治以珍珠粉
丸和定志丸服效見怔忡門

○夢遺主熱精滑主濕熱熱則流通故也

○內傷氣血虛不能固守當補以八物湯加減吞樗朮根丸

○大法用青代海石黃栢

○精滑用知母黃栢降火牡礪蛤粉燥濕白濁固法治

○一方用良姜三錢芍藥黃栢炒焦各二錢樗根白皮一兩伍錢

為末糊丸每服三十丸

○思想而得病在心治當安心神以帶補一法用溫膽湯去竹茹加人參遠志蓮肉酸棗仁茯神煎服

○一方治便毒丸藥濁

檮白皮

黃栢炒

青代

乾姜炒

滑石

蛤粉炒

神麴糊為丸服之

戴氏曰黃栢治濕熱青代解熱蛤粉散寒入腎滑石利竅妙干姜末苦飲肺氣下降使陰血生且能監制

○二陳湯治濁加升提之藥使大便潤而小便長

○珍珠粉丸治精滑白濁等証

黃栢

真蛤粉各一

珍珠

三兩

一方無此末而有

右為末水和丸如梧桐子大每服一百丸空心溫酒下

或加檮根白皮滑石青代等藥

○半夏丸治白濁

神麴

半夏燥濕

猪苓分水

麴糊丸服

○虛勞者用補陰藥胃弱者兼用人參及升麻柴胡并胃中之

清氣

○張子元氣血兩虛有痰濁陰火痛風

秘傳曰氣血兩虛便濁有痰痛風時作陰火間起小便利白濁或帶下

人參一兩

白朮半兩

熟地黃

黃柏炒 黑色二兩

山藥

海石

瑣陽各半兩

乾姜半兩 燒存性

南星

一兩 煨裂

龜板

酥炙 二兩

右為細末酒麴糊為丸如梧桐子大每服一百丸姜鹽

湯下

上

○燥濕痰治白濁方如肝脉弦者須以青代瀉肝大藥不可純

涼藥

盧氏曰病因濕熱藥誤矣然亦不可純用寒涼藥致用妙相之類又以干姜之溫而佐之也

局

○妙香散治心虛遺精白濁

赤白

射香

一錢另研

人參

半錢

木香

二錢半

茯苓

扶神

黃芪

遠志

去心炒各一兩

甘草

各五錢

辰砂

二錢另研

山藥

二兩另炙

右為細末每服二錢溫酒調服不拘時

河間

○秘真丸治思想無窮所頭不遂意淫于外入房太甚宗筋弛縱發為筋痿及為白淫及白物隨洩而下或夢與陰人通泄耳

白龍骨

一兩另研

訶子皮

大者五枚

縮砂仁

半兩

硃砂

二兩另研

以衣

右為細末麪糊為丸如葦豈大每服一丸空心溫酒下

一本可字

冷水亦不可多服大秘或用葱白茶湯下

○草薢分清飲治真元不足下焦虛寒小便白濁頻數無度漩

面如油光彩不定漩脚澄下凝結如膏糊之狀

石菖蒲

烏藥

益智仁

川車釐

白茯苓

錢各一

甘草

稍辨

右細切作一服水一盞半入塩一錢煎至一盞空心服

○治濁固本丸

東垣

蓮花鬚

黃連

炒各二兩

白茯苓

砂仁

益智

半夏

黃柏

炒各一兩

甘草

炙三兩

猪苓

二錢五錢

為末蒸餅為丸空心濕酒下五十九

冊

○九龍丹治精滑

枸杞子

金櫻子

山果子

又名蓮肉

佛座鬚

蓮花心也

熟地黄

芡實

白茯苓

川歸

各等分

右為末酒麪糊為丸如梧桐子大每服五十九或酒或

驗錄

鹽湯送下如精滑便濁者服二三日溺清如水飲食倍常行步輕健婦人厭產者二三服便往孕如仍欲產以

○水陸二仙丹治遺精白濁夢泄脫精等証

金櫻子半

芡實仁

右以芡實去壳杵為細末取金櫻子黃熟者用藍盛於水中杵去刺又於石臼中杵碎去核淨再杵細絞取自然汁煎熬成飴糖和芡實末為丸如梧桐子大每服五

一七十丸空心姜鹽湯送下

○定志珍珠粉丸治心虛夢泄

人參

白茯苓

各三兩

遠志

去心

石菖蒲

各二兩

海蛤粉

黃柏

炒焦色各三兩

樗根皮

二兩

青代

二兩

右為細末麪糊為丸青代為衣如梧桐子大每服五十

九空心姜鹽湯下

○丹溪活套云赤白濁乃胃中痰積下流滲入膀胱宜用二陳湯加升麻柴胡防風之類以提之肥白人屬濕熱加蒼朮白朮炒黃柏黃荊子之類或有挾寒者本方加炒乾姜肉桂甚者加附子○有心虛不能固守及平素虛寒之人本方加草薢石菖蒲益智炒乾姜牡蛎龍骨之類○氣虛者本方加黃芪白朮人參或加附子之類○赤者多者血虛瘦弱之人得之宜四物湯加酒知母酒炒黃柏煎湯送下珍珠粉丸○赤白濁小腹疼痛不可忍者宜作寒治東垣酒煮當歸丸最妙方見婦人門

○祖傳經驗秘真丹治婦色腎虛遺精夢泄白淫白濁等証

兔絲子

韭子

栢子仁

各二

龍骨

牡蠣

山茱萸

去核取肉

赤石脂

各半兩

補骨脂

一兩

遠志

巴戟

覆盆子

枸杞子

黃柏

鹽酒炒

山藥

各七錢半

芡實

杜仲

姜汁炒絲

金櫻子

半青黃者去刺核取肉焙乾貳兩

乾姜

炒黑一兩

鹿角膠

炒一兩半

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服一百丸空心姜

鹽湯下

○蓮塘朱顯二里病遺精潮熱不起床三月矣召予治脉之左

右寸關皆浮虛無力兩尺洪大而軟與補中益氣湯加熟

地黃知母黃柏地骨皮煎吞下珍珠粉丸外做小篋籠一

箇以籠陰堊勿使搭肉服藥三十餘貼一月平安

淋閉門

附開格五十七

論

內經曰飲食入胃滲泄精氣上輸於脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱夫膀胱者主足太陽寒水之化其体有下口而無上口者也長生在申是故西方肺金以為之母而資其化也肺金清肅則水道通調而滲營於下耳然肺金又籍脾土健旺以資化源而清氣得以上升而歸於肺以運行也故經又曰清陽出上竅濁陰出下竅故清陽不升則濁陰不降而成淋閉之患矣先哲以滴水之器譬之上竅閉則下竅不出此理甚明故東垣使灸百會穴丹溪使吐以提其氣之橫格是皆開上竅之法也原其為病之由皆膏粱之味濕熱之物或燒酒炙肉之類鬱遏成痰以致脾土受害乏力不能運化精微清濁相混故使肺金無動而水道不清漸成淋閉之候或謂用心太過勞勞無節以致心腎不交水火無制清

陽不升濁陰不降而成天地不交之否皆先哲之法言也古
方有五淋之別氣砂血膏勞是也若夫氣淋為病小便澀滯
常有餘瀝不尽砂淋為病陰莖中有砂石而痛溺不得卒出
砂出痛止膏淋為病溺濁如膏勞淋為病遇房勞即發痛引
氣衝血淋為病遇熱則發甚則溺血候其鼻準色黃者知其
為小便難也東垣分在氣在血而治之以渴與不渴而辨之
耳如渴而小便不利者熱在上焦氣分肺金主之宜用淡滲
之藥茯苓澤瀉琥珀燈心通草車前子葵麥篇蓄之類以清
肺金之氣瀉其火以滋水之上源也不渴而小便不利者熱
在下焦血分腎與膀胱主之宜用氣味俱陰之藥知母黃柏
之類滋腎丸是也除其熱泄其閉塞以滋膀胱腎水之下元
也治淋之法無越於此學者不可不知

脉法

脉經曰少陰脉數婦人則陰中生瘡男子則為氣淋脉細而數。脉盛大而實者生。脉細而澁者死。

方法

丹溪方法凡九條

丹溪曰淋雖有五皆屬於熱宜解熱利小便山梔子之類不可發汗汗之必便血

○老人氣虛淋閉參朮中帶木通梔子之屬

○有腎虛極而淋者當補腎精而利小便不可獨用利水藥

○有死血作淋者用牛膝膏一云牛膝膏能損胃不食宜斟酌用之

○一方治淋用益元散加梔子仁木通或用梔子一合炒為末白湯調下夏月以茴香煎湯調益元散服效

○痰熱滯滯中焦淋澁不通二陳湯煎大碗頓服探吐之以提

其氣

○淋澁有血因火燥下焦無血氣不得降而滲泄之令不行也
宜補陰降火以四物湯加知母黃柏或用四物湯煎下滋
腎丸

○陰莖痛乃厥陰氣滯兼熱用甘草稍蓋欲緩其氣耳

○小便因熱鬱成淋不通用赤茯苓黃芩澤瀉車前子麥門冬
肉桂滑石木通甘草稍氣虛者加黃芪木香淋痛加黃柏
生地黃夏月煎調益元散

○參苓琥珀湯治小便淋澁莖中痛相引脇下痛不可忍者

人參

茯苓

各半錢

川練子

生甘草稍

玄胡索

各七

琥珀

柴胡

川歸尾

澤瀉

各三

生齊

器用

溪州

○右細切作一服水一盞半加燈心十數並煎至一盞服

琥珀

後藥

海金砂

蒲黃各一

右為細末每服三錢空心煎萱草湯調下

○傷寒後脫陽小便不通用生姜自然汁調茴香末敷貼小腹服上又復益志茴香丸調益元散送下 智

○老人氣虛而小便不通四物湯加黃芪人參吞滋腎丸下焦血氣乾者死

○小便黃用黃柏如澁數加澤瀉若濕熱流注下焦而小便黃赤澁數用梔子澤瀉切當濕爰者宜用滑石利之

○下焦無血小便澁數而黃者用四物湯加黃柏知母牛膝甘

草稍

東恒

○通關丸 即滋腎丸 治不渴而小便閉熱在下焦血分

黃柏酒洗 知母酒洗 肉桂半

丸 右為細末熟水如梧桐子大每服一百丸空心白湯下

服後須頓兩足令藥易下行也如小便已利壅中如刀

刺痛當有惡物下為驗

東恒

○清肺飲子治渴而小便閉澀不利邪熱在上焦氣分

燈心分一 通草分二 澤瀉 瞿麥

琥珀各半 篇蓄 木通各七 車前子炒另

茯苓去皮 猪苓去皮各

右細切作一服水一盞半煎至一盞空心稍熱服

○導氣除燥湯治小便閉塞不通乃血澀致氣不運而竅澀也

茯苓去皮 滑石各一 知母去毛酒 澤瀉各一

東恒

黃柏二錢
酒炒

右細切作一服水二盞煎至一盞空心稍熱服

○腎疸湯治腎疸目黃甚至渾身黃小便赤

羌活

防風

藥本

獨活

柴胡各半

升麻

一錢已上治
目黃渾身黃

白茯苓二錢

澤瀉三分

猪苓四分

白朮五分

蒼朮一錢已上治
小便赤

黃柏二分

人參三分

葛根五分

神麴六分

甘草半錢

右細切作一服水二盞煎至一盞食前稍熱服

○小蘗湯治下焦熱結血淋

生地黄

小蘗根

通草

滑石

梔子仁

蒲黃炒

炙竹葉

當歸酒洗

生藕節

甘草稍各五

右細切作一服水煎空心服

八正散治大小便俱閉

大黃

瞿麥

木通

滑石

篇蓄

車前子

梔子仁

甘草各等

右細切每服五錢重入燈心七莖水煎服

○牛膝膏用川牛膝一合細切以新汲水五大盞煎耗其四入

射香少許空心服或單以酒煮亦可

○茯苓湯治胃疸陽明積熱食已輒飢面色黃瘦胃滿脇脹小

便閉澀

赤茯苓

陳皮去白

澤瀉

桑白皮各三分

赤芍藥

白朮

人參

官桂各二分

石膏

病甚者加大黃朴硝各一錢

右細切作一服加生姜五片水一盞半煎至一盞溫服

○倒換散治無問久新瀉閉大小便不通小腹急痛肛門腫痛

大黃蘇合 梔子剉 赤茯苓各等分 大便秘不通或半各等分

右各別研為細末每服二錢溫水調下臨時加減服

○葵子散治小便不通

黃蜀葵子剉 赤茯苓各二錢

右作一服水一盞煎二三沸食前服

○濟生葵子散治膀胱實熱小便不通方見前

○琥珀散治五淋

滑石

木通

當歸

木香

蔚金

蒲蓄

琥珀

右作一服為末用芦薈葉同煎水一盞半煎數沸食前

瀝服

○鐵服丸治大小便不通神效

六皂角燒存性

右一味不拘多少煉蜜為丸如梧桐子大每服七十丸白湯下

○廣濟雞蘇飲子治小便不通

雞蘇一別本生地黄二兩通草各四兩滑石

杏仁去皮尖冬葵子半兩石薈炙去毛

右七味細切以水六升煎至二升半去粗分三服空心進一服如人行四五里又進一服必通

○又方治小便不通

冬葵子

滑石三兩

通草

赤茯苓各一兩

茅根

二兩半

芒硝

一兩半

右細切以水六升煎取二升去粗納芒硝分作三服連

進即通

○集驗方治小便淋瀝不通

滑石伴

石薺三兩

通草四兩

榆莢

冬葵子

各一

一方加黃芩三兩

右細切以水一斗煎取三升分作三服頓飲

○石薺散治小便不利莖中作痛

石薺去腥

瞿麥一兩

滑石伍兩

車前子

三兩

冬葵子二兩

石為細末每服方寸七日三服

○祖傳經驗秘方治小便淋閉壅中作痛神效

石菖蒲

滑石

瞿麥

篇蓄

冬葵子

木通

王不留行

地膚草各等分

右爲細末每服三錢白湯調下

○又經驗治小便溺血立效

金陵草

一名旱蓮草一名黑斗草

車前草

俗名蝦蟆衣

右二物各等分杵自然汁每服半茶盞空腹服

○又方治前証用壯年無病人頭髮不拘多小燒灰存性以側

栢葉搗汁入糯米糊爲丸如梧桐子大每服一百丸白湯

下或四物湯下尤妙

○又方治沙淋乃壅中有砂作痛

石首魚腦骨

五背火蝦蟆中骨也

滑石

之勢故結散而疎通矣仍多服補血生津之劑助其真陰固其根本庶無再結之患切勿以巴豆牽牛等峻劑攻下雖暫得通快必致再結愈甚反釀成病根膠固卒難調治或有血虛脉大如葱管發熱而大便結燥者慎不可發汗汗之則重亡津液閉結而死此鑒殺之耳活人書有脾約証謂胃強脾弱約束津液不得四布但輸膀胱故小便數而大便難制脾約丸以下脾之結燥使腸潤結化津流入胃而愈丹溪曰然既曰脾約必陰血枯槁內火熾灼熱傷元氣故肺受火邪而津竭必竊母氣以自救夫金耗則土受木傷脾失轉輸肺失傳化宜其大便閉而難小便數而無藏蓄也理宜滋養陰血使陽火不熾金行清化脾土健旺津液入胃大小腸潤而通矣今以此丸用之於熱甚而氣實與西北人稟賦壯實者無

有不安者用之於東南方人與熱雖盛而氣血不實者雖得
暫通將見脾愈弱而腸愈燥矣須知在西北以開結為主在
東南以潤燥為要學者其可不知此乎

脉法

脉多沉伏而結 陽結脉沉實而數 陰結脉伏而遲或結
老人重人便結脉雀啄者不治

方法丹溪方法凡二條

丹溪曰有虛有風有濕有火有津液不足者有寒者有氣結
者切不可例用芒硝大黃及巴豆牽牛等利藥

○久病腹中有實熱大便不通宜用潤腸丸微利之不宜用峻
利之劑

○脾約丸

麻仁

一兩半用生絹袋盛百沸湯浸之

中與水面老一

許次目累乾

之

湯

分

枳實

黃色

厚朴

姜制

芍藥

三

大黃

酒

煎

杏仁

去尖尖炒另研一兩二錢

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十九溫水下

○通幽湯治大便難幽門不通上衝吸門不開噎塞不便燥閉

氣不得下治在幽門以辛潤之

炙甘草

紅花

各一

生地黃

熟地黃

各半

升麻

桃仁泥

當歸身

各一錢

右細切作一服水一盞半煎至一盞去粗調枳榔細末

半錢食前稍熱服

○潤燥湯

升麻

二分

生地黃

二分

熟地黃

當歸稍

大黃

酒溫服

生甘草

桃仁泥

麻仁

各一錢

紅花

五分

右除桃仁麻仁另研細外餘細切作一服水一盞半入

桃仁麻仁煎至一盞去粗空心稍熱服

○潤腸丸治脾胃中伏火大便閉澀或乾燥閉塞不通全不思

食及風結血閉皆能治之

桃仁

湯洗去

麻仁

去壳各

當歸稍

大黃

酒溫服

羌活

各半

右除桃仁麻仁另研如泥外其餘杵為極細末煉蜜為

丸如梧桐子大每服三五十九空心白湯下○如風濕

而大便不行加煨皂角仁大黃秦艽以利之○如脉澀

養身有氣澀而大便結者加郁李仁大黃以除氣澀燥

恒東

○麻黃白木湯治大便不通五日一次小便黃赤渾身腫面上
又腹尤甚其色黃麻木身重如山沉困無力四肢痿軟不
能舉動喘促不安

青皮

去

酒黃連

各二

黃芪

人參

桂枝

白木

厚朴

制

柴胡

蒼朮

猪苓

各四

酒黃柏

陳皮

去

甘草

半炙

升麻

各三

吳茱萸

白茯苓

澤瀉

各五

白豆蔻

炒神曲

各六

麻黃

去一節不

杏仁

四

右細切分作二服每服水二盞先煎麻黃令沸掠去沫

入諸藥同煎至一盞去粗稍熱服

東恒

○升陽瀉熱湯治腸噎不通逆氣裏急大便不行

卷之三

方

本

三

青皮

槐子各二

生地黄

熟地黄

黃柏各三

當歸身

甘草稍各四

蒼朮五

升麻七

黃芪一

桃仁十箇去皮尖另研

右細切作一服入桃仁泥水二盞煎至一盞食前熱服

○活血潤燥丸治大便秘血秘常燥結

當歸稍五錢

防風三錢

大黃酒煨

羌活各一兩

皂角仁

燒存性一兩五錢

桃仁

二兩去尖另研麻仁二兩半去

右除桃仁麻仁另研外共為細末煉蜜為丸如梧桐子

大每服五十九白湯下三兩服後須以麻子仁煮粥每

日早晚食之大便須日久再不結燥也此丸藥以磁罐

盛罽紙包封毋令見風

○潤腸湯治大便結燥不通

東垣

東垣

恒刺

恒東

生地黃

生甘草各三

大黃煨

熟地黃

當歸稍低

升麻

桃仁

麻子仁各一錢

紅花三

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗空心服

○潤体丸能潤血燥治大便不通

麻仁

當歸稍

生地黃

桃仁

枳壳各等

右為細末煉蜜為丸服

○備急大黃丸治胃中停滯寒涼之物大便不通腹痛方見內

○河間枳壳丸治三焦約大小便不通穀氣不得下行

枳壳兩

陳皮兩

枳殼兩

木香二錢半

黑丑

四兩一半生用一半炒熟作頭末一兩半余不用

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服十五丸姜湯下

○枳實導滯丸治傷熱物大便不行氣滯胃腹作痛

方見內傷

○本邑趙德秀才之母年五十餘身材瘦小得大便秘結不通飲食少進小腹作痛召予診治六脉皆沉伏而結滯予作血虛治用四物湯加桃仁麻仁煨大黃等藥數服不通反加滿悶與東垣枳實導滯丸及備急大黃丸等藥下咽片時即吐出蓋胃氣虛而不能久留性速之藥耳遂以備急大黃丸外以黃蠟包之又以細針穿一竅令服三丸蓋以蠟匱者制其不犯胃氣故得出幽門達大小腸取效也明日下燥屎一升許繼以四物湯加減作湯使吞潤腸丸如此調理月余得大便如常飲食進而平安

○予族姪有一通判之子因出痘大便閉結不通凡醫云
便實為佳兆自病至痘瘡愈後不如廁者凡二十五
日肛門連大腸不勝其痛叫號聲達四隣外醫及予
二三人議藥調治用皂角末及蜜煎導法服以大小
承氣湯及枳實導滯丸備急丸皆不效計無所出予
曰此痘瘡餘毒鬱熱結滯於大小腸之間而然以香
油一大盞令飲自朝至暮亦不效予畫一計令侍婢
口含香油以小竹筒一箇套入肛門以油吹入肛內
過半時許病者自云其油入腸內如蚯蚓漸上行
再過片時許下黑糞一二升止困睡而安

黃疸 五十九

論

內經曰中央黃色入通於脾又曰諸濕腫滿皆屬脾土夫黃疸爲病肌肉必虛腫而色黃蓋濕熱鬱積于脾胃之中久而不散故其土色形于面與肌膚也蓋脾主肌肉肺主皮毛母能令子虛母病子亦病矣是故有諸中者必形諸外耳其証有五曰黃汗曰黃疸曰酒疸曰穀疸曰女勞疸雖有五者之分終無寒熱之異丹溪曰不必分五同是濕熱如蠶曲相似正經所謂知其要者一言而終是也外有傷寒熱病陽明內實當下而不得下當汗而不得汗當分利而不得分利故使濕熱拂鬱內甚皆能令人發黃病也先哲制茵陳五苓散茵陳湯茯苓滲濕湯之類凡不應手獲效故曰治濕不利小便

非其治也又曰濕在上宜發汗濕在下宜利小便或二法並用使上下分消其濕則病無有不安者也學者詳之

脉法

脉經曰凡黃候寸口脉近掌無脉口鼻黑色並不可治

脉沉渴欲飲水小便不利者必發黃也

酒疸者或無熱靖言了了腹滿欲吐鼻燥其脉浮者先吐之
沉弦者先下之

酒疸下之久久為黑疸目青面黑心頭如噉蒜齏之狀大便
正黑皮膚四肢不仁其脉浮弱顏黑微黃故知難治

穀疸寸口脉微而弱微則惡寒弱則發熱當發不發骨節疼
痛當煩不煩而極汗出跌陽脉緩而遲胃氣反強飽則煩
滿則發熱客熱消穀食已則飢穀強肌瘦名曰穀疸

陽明病脉遲者食難用飽^上則發寒熱頭眩者必小便難此
欲作穀疸雖下之腹滿如故

跌陽脉緊而數^上則為熱^上則消穀緊則為寒食則滿也
尺脉浮為傷腎跌陽脉緊為傷脾風寒相搏食已則眩穀氣
不消胃中澀濁^上氣下流小便不通陰被其寒熱流膀胱
身體盡黃名曰穀疸

方法 丹溪方法凡五條

丹溪曰不必分五同是濕熱如蠶麴相似輕者小濕中丸重
者大濕中丸熱多加黃連濕多者茵陳五苓散加食積藥
戴氏曰食積者還其虛實下之其餘但利小便便
清利則黃自退或曰黃疸宜用利倉法又曰黃疸
急脾胃不和食小胃苓湯小便赤加滑石

○一方治黃疸

黃芩

黃連

梔子

茵陳

猪苓

澤瀉

蒼朮

青皮

草龍胆

各五

穀疸加三稜義木縮砂陳皮神麴

右細切作一服水煎服之

○又方治氣實傷濕渾身發黃宜吐法

撫芎

梔子

桔梗 各二錢

右細切作一服加姜煎入鹽汁服探吐之

○小濕中丸治黃疸與食積又可制肝燥脾脾虛者須以白水

作湯使

針砂

十兩醋炒七次令通紅另研

若參

夏加冬減

山查

各二

朱萸

一兩冬減

蒼朮

半斤

白朮

五兩

川芎

夏減

神麴

各半斤

香附米

一斤童便浸一宿

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服七八十丸食前
鹽湯下。一方無白朮山查若參朮更有梔子

○大溫中丸

針砂十兩如陳皮

蒼朮

青皮

厚朴姜制

三稜醋煮

莪朮醋煮

黃連

若參

白朮各五兩

生甘草二兩

香附受一斤童便

右為細末醋糊為丸

一方无黃連若參白朮一方又无甘草各溫中丸

○調胃承氣湯

方見傷寒門

叔和曰腹滿舌痿煩燥不得嚙屬黃家又曰病黃疸發熱
煩喘胞滿口燥者以發病時火劫其汗兩熱相搏然黃家
所得從濕故一身尽發熱而黃如壯熱者熱在裏也當下
之安用調胃承氣湯

○又曰黃疸之病當以十八日為期治之十日以上為差又劇者為難治○又曰病疸而渴者其病難治疸而不渴者其病易治發於陰部其人必嘔發於陽部其人振寒而發熱也師曰諸黃家病但宜利小便假令脉浮當以汗解之宜桂枝加芍藥湯又名黃芪建中湯方見傷寒門

○又曰男子黃小便利自當與小建中湯○又曰黃疸腹滿小便不利而利自汗出此為未和裏實當下之用大黃黃栢梔子芒硝湯

○大黃黃栢梔子芒硝湯

黃栢

芒硝

大黃錢各四

梔子三枚

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服

○又曰黃疸病小便色不變欲自利腹滿而喘不可除熱上除

必噦者宜服小半夏湯方見傷寒門

○又曰夫病酒發黃疸必小便不利其候心中熱足下熱是其証也又心中懊懣而熱不能食時欲吐名曰酒疸又曰酒疸心中熱欲嘔者吐之即愈又曰酒疸黃色心中實熱而煩

○又曰額上黑微汗出手足心熱薄暮則發膀胱急小便自利名曰女勞疸腹如水狀不治

○又曰黃家日晡所當發熱而反惡寒此為女勞得之膀胱急小腹滿一身尽黃額上黑足下熱因作黑疸其腹脹如水狀大便必黑時溲此女勞之病非水也腹滿者難治硝石礬石散主之

○硝石礬石散

和叔

問同

漢用

方局

右以二石各等分燒煨為末每服貳錢以大麥粥汁和服日三服取汗愈若小腸痛急小便不利用滑石石膏各二錢入粳米一撮同煎服之

○治酒疸用小柴胡湯加茵陳豈歧大黃黃連葛根煎服效

○茯苓湯治胃疸消穀善飢面色痿黃心中煩熱胃脇脹痛小便赤澀方見淋秘門

○一方治穀疸以柴胡穀芽枳實厚朴梔子大黃等分水煎服

効

○胃苓湯治脾胃不和黃腫如小便赤澀如滑石五苓散合平

腎疸湯治腎疸目黃或渾身黃小便赤澀

升麻

羌活

防風

藁本

獨活

柴胡

蒼朮

猪苓

各半錢

一錢

四分

葛根五

澤瀉三

黃芩二

甘草三

神麴炒三分

黃柏二

白朮五

人參三

右細切作一服水一盞半煎至一盞去粗溫服

人活

○茵陳五苓散治傷寒或伏暑發黃小便不利煩渴等証

本方倍加茵陳入姜棗煎服之

人活

○茵陳茯苓湯治發黃尿沉細數四肢冷小便澀煩躁而渴

茯苓

桂枝

猪苓各一

滑石一錢半

茵陳二錢

右細切作一服水一盞半煎至一盞服如尿未出加當

歸一錢半

人活

○梔子大黃湯治酒疸心中懊懷或熱而痛

梔子十四

大黃一兩

枳實五

豉一

右作一服用水五升煎至二升分三服

○半溫半熱湯治酒疸身黃無熱靖言了了腹滿欲嘔心煩足熱或有癥瘕心中懊惱其脈沉弦緊細

半夏

茯苓

白朮各七

前胡

枳殼炒黃

甘草炙

大戟各五

黃芩

茵陳

當歸各三分

右細切作一服入生姜三片水二盞煎至一盞溫服

○茵陳蒿湯治身熱鼻乾汗出陽氣上奔小便赤澀不利濕熱發黃

茵陳蒿一兩 大梔子三枚 大黃三錢半

右細切作一服水三盞半溫服

○茵陳大黃湯治傷寒大熱發黃面目俱黃小便赤澀

茵陳蒿

梔子

柴胡

黃芩

黃芩

升麻

大黃各七分 草龍膽三分半

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服

○梔子栝皮湯治身熱不去大便利而煩熱身黃

梔子

黃栝

黃連各三錢半

右細切一服水一盞半煎至一盞溫服

○茯苓滲濕湯治黃疸寒熱嘔吐而渴欲飲冷水身目俱黃小

便不利不思飲食方見溫証門

○小茵陳湯治發黃臑沉細而遲遍身冷

附子

一枚作八片炮

甘草

炙一兩茵陳二兩

右細切作三服每服用水二盞煎至一盞溫服

○茵陳四逆湯治發黃臑沉細而遲肢體逆冷腰以上自汗

人活

甘草兩

乾姜兩

附子一枚作片炮 茵陳二兩

右細切分作四服水煎服

○葶藶苦參散治濕熱內甚小便赤澀大便時秘飲食少進諸藥不效因為又黃

苦參

黃連

瓜蒂

黃柏

大黃兩

葶藶子兩

右為細末每服一錢匕清米飲調下以吐利為度隨時

看虛實消息加減

人活

○當歸白朮湯治酒疸發黃心下有痞癥堅滿身體沉重妨害

飲食小便赤黃此因內虛飲食生冷脾胃痰結所致

白朮

茯苓各一錢

當歸

黃芩

茵陳各三分

前胡

枳實

甘草炙

杏仁 各六分 半夏 八分 炮

右細切作一服加生姜三片水一盞半煎至一盞溫服

○抵當湯治傷寒熱鬱瘀血內結身黃脉沉細狂言譫語小便

自利大便秘黑方見傷寒門

○針砂丸治穀疸酒疸晁熱發黃等証

針砂半斤醋紅蒼木四兩香附四兩神麴炒微黃

茵陳炒姜汁麥蘖取麴炒芍藥各二兩當歸酒洗去頭

生地黃 川芎 青皮去穢炒各一兩半

陳皮去白義木醋煮三稜醋煮各二兩梔子去壳炒

姜黃 升麻 乾漆各半兩

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服六七十丸姜湯

送下

則成

○綠礬丸治黃腫病最捷

五倍子半斤黑綠礬四兩白針砂四兩神麴半斤

右為細末生薑汁煮紅棗肉為丸如梧桐子大每服六

七十丸溫酒下不能飲酒米湯亦可終身忌食蕎麥麪

犯之再發難治

○棗礬丸治食勞身目俱黃

綠礬半斤火煨通紅

右研細紅棗肉為丸如梧桐子大每服五十九或酒或

姜湯下

○祖傳經驗秘金丸治黃腫絕妙

蒼朮半斤白朮各二兩甘草半兩厚朴姜汁拌

陳皮去白一兩針砂醋炒紅色香附童便浸申曲炒黃色

麥蘖麪

炒微黃各一兩半有愧加三棱醋煮我木醋煮

半兩

右為細末麪糊為丸服忌魚腥濕麪生冷菓等物

○一男子年三十餘得穀疸症求予治以胃苓湯去桂加茵陳數十貼黃退自以為安不服藥十數日後至晚目盲不見物予曰此名雀目蓋濕痰盛而肝火有餘也用獺猪肝煮熟和夜明砂作丸服之目遂明如故來謝予曰未也不早服制肝補脾消痰之濟必則蠱脹但不信半月後腹漸脹痞滿復來治予仍以胃苓湯倍二朮加木通麥門冬煎湯下褪金丸一月平安

瘡瘍六十

論

內經曰諸痛痒瘡瘍皆屬心火又曰膏粱之變足生大丁榮氣不從逆於肉理乃生癰腫東垣謂榮氣即胃氣也蓋胃也調和則榮衛之氣皆順流而無逆於肉理耳若夫飲食失節肥甘過傷以致濕熱蘊積于腸胃之間燒燥府藏煎熬真陰此經之所謂陰之五宮傷在五味味焉發熱久而增氣故濕熱之氣聚於下焦陰火熾盛蓄於八脉八脉沸騰逆於經絡氣凝血滯故其滋養精微之氣不能如常榮於肉理是以結聚而成癰腫矣經曰熱勝則肉腐是也法當視其所發之地各從其經而處治焉夫發於身之表者其名一十有七曰

發

督脉足

曰背發

中属督脉

曰髮發

手足少

曰肩發

手足

曰

腿

經手足曰頤發明經足陽曰頤領發明經足陽曰髭發明經足陽曰腋
發陽經太曰穿當發督衝任曰根發表足三陽曰腎癰足經曰
喉癰明經曰膺癰明經曰乳癰內陽明經外少陽曰腎癰
足太曰驂馬癰足經曰囊癰足經發於腔子之內者其名有
曰四內疽曰肺癰陰經曰腸癰手陽明經曰胃脘癰足陽天十
二經有氣血多少之不同癰疽淺深之有異是故為治之法
或疎散或消毒或針烙或內托或外消或瀉利或補益是故
腫瘍為實宜瀉利潰瘍為虛宜補益浮露而淺者為癰宜外
消截伏而深者為疽宜內托此千古不易之定議也雖然其
証有善而易治者為順惡而難消者為逆其為眼白睛黑目
緊小者一逆也不能飲食納藥而嘔食不知味二逆也傷痛
渴甚三逆也轉項轉動不便四肢沉重四逆也聲嘶色脫唇

肝

鼻青黑面目四肢浮腫五逆也煩燥時咳腹痛甚泄利無度
小便如淋六逆也膿血大洩愀腫尤甚膿水臭敗莫近七逆
也喘麤氣短恍惚嗜卧八逆也未潰先黑陷下青唇黑便汚
九逆也又如噫氣痞塞喘咳身冷自汗目瞪耳聾恍惚驚悸
語言錯亂皆是惡証若夫動息自寧飲食知味一順也便利
調勻二順也神彩精明語聲清朗三順也膿潰腫消色鮮不
臭四順也體氣和平五順也凡五順見三則吉九逆見六則
危矣先哲垂訓班班可攷學者其可不詳察乎

脉法

脉經曰脉數身無熱內有癰也一云腹無積聚身無熱脉數
此爲腸中有膿意以附子敗醬湯主之

者浮數脉應當發熱而反洒淅惡寒若有痛處當發癰膿脉

微而遲反發熱弱而數反振寒當發癰腫

脉浮而數身体無熱形嘿上胃中微燥不知痛之所在此人當發癰腫

脉滑而數上則為熱滑則為實滑則主榮數則主衛榮衛相逢則結為癰熱之所過則為膿也

羽林婦病醫者脉之知婦人腸中有膿為下之即愈蓋寸口脉滑而數滑則為實數則為熱滑則為榮數則為衛上數下降榮滑上升榮衛相干血為濁敗小腹痞堅小便或澁或時汗出或復惡寒膿為已成設脉遲緊聚為瘀血下之則愈

陽癰之為病其身体甲錯腹皮急按之軟如腫狀

夫陽癰者小腹腫按之則痛小便數如淋時上發熱自汗出

復惡寒其脉遲緊者膿未成可下之當有血脉洪數者膿已成不可下也大黃牡丹湯主之

方法

丹溪方注
二十二條

丹溪曰癰疽因陰陽相滯而生蓋氣陽也血陰也血行脉內氣行脉外相並周流寒與濕搏之則凝泣而行遲為不及熱與火搏之則沸騰而行速為太過氣得邪而鬱津液稠粘為痰為飲積久滲入脉中血為之濁此陰滯於陽也血得邪而鬱經道阻隔或溢或結積久滲出脉外氣為之亂此陽滯於陰也百病皆由於此又不止於癰疽而已

○癰疽因積毒在藏府當先助胃壯氣使根本堅固而以行經活血藥為佐參以經絡時令使毒氣外發施治之早可以內消此內托之意也

○或問內托之法予曰河間治腫炊于外根盤不深形証在表其脉芤浮病在皮肉非氣盛則必侵于內急須內托宜復煎散除濕散鬱使胃氣和平如或未已再煎半料飲之如大便閉及寒熱少服黃連湯如微利及煩熱已退却與復煎散如此使榮衛俱行邪氣不能內傷也

○外科精要謂排膿內補十宣散治未成者速散已成者速潰誠哉是言也若用之於小瘡癰與冬月亦可轉重就輕移深居淺若潰瘍與夏月用之溫散佐以防風白芷吾恐雖有參芪難為倚仗比見世人用此不分輕重時令經絡前後正若盲人騎瞎馬半夜臨深池危哉

○諸經惟少陽厥陰二經生癰疽宜預防之以其多氣少血也血少而肌肉難長瘡久未合必成死証苟不知此遽用驅

點丹

逐利藥以伐其陰分之血禍不旋踵

○腫瘍內外皆壅宜以托裏表散為主如欲用大黃者宜戒猛浪之非

○潰瘍內外皆虛宜以補接為主如欲用香散者宜戒虛上之失

點丹

○外科精要一書惟務紀錄舊方應酬輕小証候耳

點丹

○癰疽始發即以艾多灸之可使輕淺騎竹馬灸法最妙蓋艾火暢達拔引鬱毒此從治之意惟頭為諸陽所聚艾炷宜小而少若身上必痛灸至不痛不痛灸至痛亦有因艾而死者蓋虛甚孤陰將絕其脉必浮數而大且不鼓精神必短而昏無以抵當火氣宜其危也○按河間灸刺法曰凡瘡瘍潰分經絡部分血氣多少腧穴遠近從背出者當從

太陽經五穴選用至陰通谷束骨崑崙委中是從髀出者當從小陽經五穴選用竅陰夾谿臨泣陽輔陽陵泉是也從髀出者當從陽明經五穴選用厲兌內庭陷谷衝陽解谿是也從腦出者則以絕骨一穴治之略入針灸法俱見不再具

○蟬針之法可施於輕小証候吮出惡血若積毒在藏府者徒竭其血於外無益也

○外施貼藥亦發表之意精要謂貼冷藥有神效夫氣得熱則散得冷則歛何謂神效經曰發表不遠熱是也貼冷藥惟輕小瘡毒也

○外科用針烙得膿後服神仙追毒丸此藥能下積取毒無取膿之功若血氣壯實則膿自出當以和氣活血藥佐參芪

補劑服之

○腫瘍用手按之熱則有膿不熱則無膿

○膿出而反痛者此為虛也宜補之亦有穢氣所觸而作痛者宜和鮮之風冷所逼者宜溫養之

○疽發深不痛者胃氣大虛必死肉多而不知痛也

○腫瘍時嘔者當作毒氣上攻治之潰後當作陰虛補之若年
老潰後發嘔不食又宜參芪白朮膏峻補隨証加佐使藥
河間謂瘡瘍嘔者濕氣侵于胃也宜倍白朮

○癰疽發渴乃血氣兩虛用生芪以補氣當歸地黃以養血或
忍冬丸黃芪六一湯皆効

○如味十全大補湯治癰疽潰後補氣血進飲食實為切要凡
膿血出多陰陽兩虛此藥有迴生起死之功但不分經絡

不載時令鑒者觸類而長之可也或見腫平痛寬遂以爲安慢不知省無補接調養之功愈後虛証復見因而轉爲他病而危劇者多矣

○蒲公英化熱毒消惡腫散結核有奇功田間路側皆有之三四月開黃花似菊花味甘衍義補遺云四時常花上罷飛絮節葉間折之有白汁出者是能解食毒散滯氣可入陽明太陰二經同忍冬藤煎以少酒佐而服之搗爛盪之亦妙

○白蠟屬金稟收斂堅凝之氣外科之要藥也生肌止血定痛接骨續筋補虛當與合歡皮同入長肉膏藥用之有神効但未試其可服否若合歡皮常服之驗矣

○葶藶子性善收能追膿取毒亦要藥也

○癰疽已破未破用皂角刺能鑽引至痛處

取剩骨法

○取久疽久痔漏中朽骨俗名用烏骨雞胫骨以信砒實之煨

泥固濟火煨通紅地上出火毒用骨研細飯丸如粟米大以皮紙撚送入竅內外以拔毒膏藥封之其骨自出

惡瘡發背腦疽等証方法

○升陽益胃散治一切惡瘡發背腦疽等証

羌活一錢半獨活五分防風五分藁本一錢半

知母一錢生地黄一錢黃芩一錢黃連半錢

黃柏半錢當歸三錢防風稍半錢連翹二錢

人參半錢黃芪一錢半生甘草一錢陳皮半錢

當歸稍半錢蘇木半錢炙甘草半錢酒防已半錢

澤瀉七分

桔梗一錢

右細切分作二服每服用水二大盞浸半日煎至一盞
滴酒數十點去粗臨卧溫服忌飲水再作膿効遲初患
二三日者服之立消作膿者立潰隨病上下食前後服
一人患腦疽第八日腫硬如拳即日脫服此藥一劑次
日便平復腫勢消更不疼痛又服半劑七日全愈如常
明之言凡瘡皆陰中之陽上中之陰二証而已我治此
瘡陽藥七分陰藥三分名曰升陽益胃散勝十宣也老
人宜之亦名復煎散或加乳香沒藥各一錢尤妙

○當歸羌活湯治腦疽証

黃芩酒炒

黃連酒炒

各錢

黃柏酒炒

澤瀉半錢

連翹一錢

當歸身二錢

防風

姜活各一錢

恒東

甘草 灸一錢 山梔子 一錢 獨活 七分 藥本 七分

右細切作一服水二盞先浸一時許入酒一匙煎至八分去粗食後稍熱服日進二服三日及六服俱將藥清

○ 檳榔散大斂瘡口

檳榔 木香 各三錢

右爲細末用煎湯調下或斂瘡口用之決無疼痛以蠟油調塗瘡口生肌斂肉甚速別無惡肉瘡口易合平復膏梁熱瘡所宜用也貧人寒地及寒濕外來之寒瘡禁不可多用

背疽方法

○ 升金托裏散治背疽併諸惡瘡如三日以裏未針灸及利大

便者則可消矣

羌活一錢半

防風

酒洗半錢

仿風

稍半錢

藥本

一錢半

當歸身三錢

當歸

稍半錢

連翹

三錢

黃芩

三錢酒浸

耆

黃芩一錢半

人參

一錢半

炙甘草

半錢

生甘草

半錢

陳皮半錢

蘇木

五味子

酒黃栢

酒防已

各半錢

桔梗

梔子

生地黄

酒洗各一錢

酒大黃三錢

酒黃連

一錢

木猪苓

半錢

麥門冬

二錢

右細切分作二服每服用水三大盞浸半日煎至一盞稍熱服後一服如前併粗再煎服忌冷水此方如查病即便忙服無不効者若瘡勢已發三四日或成膿則不消也崔經歷二次發背疽皆得此方而愈

○丹溪治背疽方用大黃防風羌活甘草節生地黃當歸身具

母白芷赤芍藥皂角刺黃芩作大劑煎服氣虛加人參黃芪瘡潰後亦宜加之

附骨疽方法

○丹溪曰附骨疽者皆因久得厚味又勞役與酒後涉水得此陽滯於陰之証也又曰環跳穴痛不止防生附骨疽以蒼朮為君佐以黃柏之辛行以青皮冬加桂枝夏加條芩體虛者加杜仲牛膝以生甘草為使作大料煎入姜汁食前飲之痛甚者恐煎藥十數貼發不動少加麻黃一二貼又不動者恐疽將成急掘地坑以火煨坑通紅沃以小便令患赤体坐於坑中以薦或綿衣圍抱下体使熱氣熏蒸腠理開氣血通暢而愈

○羌活方里湯治附骨疽初發於太陽厥陰太陰分者

羌活

川芎

蒼朮

防已

木香

連翹

射干

甘草

白芍藥

木通

當歸尾

蘇木 各七分

右細切水酒各一大盞煎至七分食前服美膳壓之

東垣 托裏黃芪湯治骨疽初發於足少陽七明分者

柴胡

一分二錢

連翹

肉桂

黍粘子

黃芪

八分

當歸尾

一分二錢

黃柏

四分

升麻

四分

甘草

四分

白芷

一錢

右細切作一服酒一盞水一盞半煎至一大盞空心服

美膳壓之

東垣 內托黃芪酒煎湯治瘡生腿外側或因寒濕得附骨疽於足

少陽經分微侵足陽明經堅破漫腫行步作痛或不能行

柴胡六錢半連翹八分

肉桂八分

大力子炒

黃芪各四錢當歸尾八錢

黃柏五分

升麻九分

甘草炙五分白芷二錢

右細切水酒各一盞煎至一盞食前溫服

○黃連消毒飲治附骨疽

黃連一錢

黃芩

黃柏各半錢生地黃四分

知母四分

羌活錢一

獨活四分

防風四分

藁本五分

當歸尾四分

桔梗五分

黃芪二分

人參二分

甘草三分

連翹四分

蘇木二分

防己五分

澤瀉二分

陳皮三分

右細切作一服水煎服一老人年七十因寒濕地氣得

附骨疽於左腿外側少陽膽經之分微侵足陽明經分

闊六七寸長一小尺墜硬漫腫不辨肉色皮澤但行步作痛以指按至骨大痛與此藥一服即止次日堅軟腫消而愈

○內托黃芪柴胡湯治附骨疽

生地黄

一分 黃柏

二分

肉桂

二分

羌活

五分

當歸

稍半

土瓜根

酒洗

柴胡

稍略

一連翹

一分

黃芪

二錢

右細切作一服酒一盞水二盞煎至一盞去粗空心熱服賈德茂小男於大腿近膝股內出附骨疽不辨肉色漫腫光澤木硬瘡勢甚又其左脚乃肝之髀上也更在足厥陰肝經之分少侵足太陰脾經之分其脉左二部細而弦按之洪緩微有力與此藥而安

腎癰方法

○丹溪曰腎癰者腎居小腹之後在下此陰中之陰道遠位僻
雖曰太陽多血然氣運不到血亦罕來中年後尤慮患此
緣有腫痛叅之脉証但見虛弱便與滋補血氣可保終吉
若無積補之功其禍多在結痂之後或半年已來乃病
致失手慎之慎之

○內托羌活湯治足太陽經中左右尺脉俱緊按之無力尻腎
生癰堅硬腫痛太作

羌活

黃柏

酒炒各二錢

防風

藁本

當歸尾

各一錢

肉桂

分三

連翹

甘草炙

蒼朮

陳皮

各五

黃芪

一錢半

右細切作一服水二盞酒一盞煎至一盞去粗稍熱空

心服以衣覆蓋癰上使藥力行去衣

內疽方法

○丹溪曰內疽者皆因飲食之火挾七情之火相鬱而發飲食者陰受之七情者藏府受之宜其發在腔子而頭向內非干腸胃膏膜也宜以內托之藥托出于外以針開之而愈先用四物湯加桔梗香附生薑煎服膿出後亦用四物湯調理而安

肺癰方法

○丹溪肺癰先須發表千金方曰病咳唾膿血其脉數實或口中咳胃中隱上痛脉反滑數者為肺癰其脉緊數為膿未成緊去而但數者膿已成也

○要畧治肺癰先以小青龍湯一貼以解表之風寒邪氣然後

以葶歷大棗瀉肺湯枯硬湯葦葉湯隨証用之以取膿此
治腫瘍之例也終以守宮獨行方名黃以補裏之陰氣此
治潰瘍之例也

○黃昏湯治胸中甲錯隱痛知為肺癰

合歡木皮一掌大

右以水三盞煮取一盞半分二服

○葶歷大棗瀉肺湯治肺癰或肺脹喘促不得卧

葶歷

一兩炒黃研為細末煉蜜丸如彈大 十枚

右以水三盞煎大棗至二盞去棗入葶力一九再煎至

一盞攪勻服之

○葦葉湯治欬有微熱煩燥腎心甲錯出千金方

葦葉二升

薏苡仁半斤 桃仁五十箇 瓜瓣半升

驗方

右以水一斗先煮葦葉至五升去粗入諸藥煮取二升分溫再服當吐痰如粥而愈

○桔梗湯治肺癰心胞氣壅咳嗽膿血心神煩悶咽乾多渴兩脚腫滿小便赤黃大便多澀

桔梗

具母各一錢

當歸

瓜麥子各八分

枳殼炒

五分薏苡仁八分

桑白皮五分防己五分

甘草節

三分黃芪五分

杏仁去尖炒

百合各三分

右細切作一服水一盞半加生薑五片煎至八分去粗溫服不拘時若大便秘者加大黃小便澀者加木通

○又方治前証

瓜麥子

當歸

桔梗

具母

白芷

甘草各一錢

右細切作一服水一盞食後服一方無具母白芷有葶
壺子

○肺癰已破入風者不治或用太乙膏丸服以搜風湯吐之
○有吐膿血如肺癰狀口臭他方不應者宜消風散入無病男
子髮灰清米飲調下可二服而愈

○祖傳經驗秘方治肺癰未成膿者立消已成膿者立潰其効
如神用章漆樹葉一名接骨木又名繼骨樹又名野黃楊
酒田塍路側皆有之右一味細研畧入酒過以好調服不飲
酒入入生姜研服

腸癰方法

○丹溪曰腸癰當作濕熱積治入風難治

○千金謂腸癰妄治必殺人其病小腹重強按之則痛小便數

經絡經脈
卷之六
八

林時時汗出復惡寒身皮甲錯腹皮急如腫狀脉數者微有膿也巢云洪數已有膿脉若遲緊者未有膿甚者腹脹大轉側有水聲或逆臍生瘡或膿自臍出或大便膿血羽林婦証具前脉法下

名冊

○腸癰治法要畧以薏苡附子敗醬散千金以大黃牡丹湯

○灸法屈兩肘正肘頭銳骨端灸一百壯下膿血而安

實金

○薏苡附子敗醬散

薏苡仁一錢炮附子一分敗醬三分

右為細末每服方寸匕水二盞煎至一盞連粗頓服之小便當下膿血而食愈

千金

○大黃牡丹湯

大黃四分牡丹皮一兩桃仁五十枚去皮煎另研

尖

芒硝三分

瓜蒌子 半升

右細切用水六升煎取一升去粗入芒硝再煎一沸分三服頓服之有膿即下膿無膿即下血

○東陽呂俊文得潮熱微似瘡狀小腹右邊有一塊大如雞卵作痛右脚不能伸縮一鑿作膿豚氣治十餘日不驗召予診候其脉左寸乳而帶瀉右寸乳而洪實兩尺兩關俱洪數予曰此大小腸之間欲作癰耳幸膿未成猶可治療與五香連翹湯加減與之間以蜈蚣炙黃酒調服之三日内平安

乳梗方法

○丹溪曰乳梗多因乳母不知調養所致蓋乳房陽明所經乳頭厥陰所屬忿怒所逆鬱悶所遏羣味所釀以致厥陰之

氣不行故竅閉而汁不通陽明之血沸騰故熱甚而化為
乳膿或因所浮之子膈有滯痰含乳而嚙口氣熾熱所炊而
成結核初便忍疼揉令核軟吮令汁透可散否則結成矣
治法以青皮踈厥陰之滯石膏清陽明之熱生甘草節行
汚濁之血瓜蒌子消導腫毒或加沒藥青橘葉皂角刺金
銀花當歸身或湯或散須以少酒佐之若加艾火二三壯
於痛處灸之尤妙彼粗工便用針刀必成拙病

○乳癰用蒲公英同忍冬藤入少酒煎服即欲睡是其効也

乳癰未潰以青皮瓜蒌桃仁連翹川芎橘葉皂角刺甘草節
隨証加減煎服已潰以人參黃芪川芎當歸白芍藥青皮
連翹瓜蒌甘草節煎服

○東垣升麻托裏湯治婦人兩乳間出黑頭瘡上頂陷下作黑

夏 暑 瘡 丹 人 丹 夏 暑 瘡 丹

眼子其脉弦洪按之細小

黃柏二分

肉桂三分

黍粘子

五分 黃芪

炙甘節

當歸身

錢各一

連翹

升麻

葛根各一錢半

右細切作一服水一盞酒半盞同煎至一盞食後熱服

妳岩方法

○石香程氏曰妳岩始有核腫結如贅瘻子大不痛不痒五七

年方成瘡初便宜多服疎氣行血之藥須情思如意則可

愈如成瘡之後則如岩穴之凹或如人口有唇赤汁膿水

浸淫胞脇氣功疼痛用五灰膏金室膏去其蠹肉生新肉

漸上收斂此疾多生於憂鬱積忿中年婦人未破者尚可

治成瘡者終不可治

方局

○十六味流氣飲治妳岩

人參

黃芪

川歸各一錢

川芎

肉桂

厚朴

白芷

甘草各半錢

桔梗三分

防風

烏藥

檳榔

芍藥

枳壳

木香各半錢
紫蘇一錢半

右細切作一服或加青皮一錢水二大盞煎至一盞服

○單煮青皮湯治婦人百不如意久積憂鬱乳房内有核如繫

碁子

每服用青皮四錢細切以水一盞半煎至一盞日二服已

上二方間服至核消佳藥

○橘葉散治証如前

青皮

石膏煨

甘草節各半

瓜蒌子一錢

當歸頭

五分

皂角刺

一錢半

去尖畧炒

金銀花

五分

沒藥

蒲公

各五分

右細切作一服加青橘葉一小握以酒一盞半煎至一

淺盞食後或卧時服

○丁香散治乳頭破裂或因小兒吹乳血乾自裂開多痛

丁香不拘多少

右一味為末乾付裂處如燥噉津調付

囊癰方法

○丹溪曰囊癰者濕熱下注也有作膿者此濁氣順下將流入

滲道因陰道或虧水道不利而然膿尽自安不藥可也惟

在善於調攝耳又有因腹腫漸流入囊腫甚而囊自裂開

舉丸懸掛冰出以輔炭末付之外以紫蘇葉包裹仰臥養

之

丹

○癰疽入囊者曾治數人悉由濕熱入肝經處治而用補陰藥

佐之雖膿潰皮脫舉丸懸掛者皆不死

錄

○一方用野紫蘇葉面青背紅者是也焙乾為細末付之如燥以香油

調付囊脫無皮者外以青荷葉包之其皮自生

丹溪便毒方法

丹

○便毒是厥陰經濕熱因勞倦而發用射干三寸同生姜煎食

前服得利二三行効射干開紫花者是紅花者勿用

○一方用破故紙黍粘子微炒黑牽牛炒大黃酒蒸焙乾各等

分為末每服一两酒調下

○又方已結成膿者用大黃酒拌蒸連翹各五錢枳實三錢

厚朴

甘草節各二錢桃仁二十一箇

生薑三片分三服水煎服之

○石香程氏曰便毒一名驕馬癰此奇經衝任為病而癰見於
厥陰經之分野其經多血又名血疔或先有疳瘡而發或
卒然起核疼痛而發皆熱鬱血聚而成也初發宜疎利之
即散癰膿後如常用托裏內補之藥

○蘇方散治便毒

木鱉子去殼

當歸尾

芍藥

白芷

汾甘草

川芎

射干

忍冬即金銀花

大黃

川山甲

唐火

沒藥

蘇木

各六分

右細切作一服水酒各一盞煎至一盞食前服

○玉燭散

川芎

當歸

生地黃

赤芍藥

朴硝

大黃

甘草 多各八分

右細切作一服水煎食前服

○牡蠣大黃湯

大黃

牡蠣各二錢 甘草一錢

瓜蒌一箇去皮

右細切作一服水二盞煎至一盞溫服

療癰方法

○丹溪曰癰癰必起於少陽一經不守禁忌延及陽明大抵食
味之厚鬱氣之積曰風曰熱皆此二端拓引交換須分虛
實二者易治虛者可慮以其屬膽經主決斷有相火且氣
多血少婦人見此若月經不作寒熱便生稍久轉為潮熱
危矣自非斷慾食淡神仙不治也

丹

○治癰癰用立效散與瓜蒌散相間服神效

○本草云夏枯草大治瘰癧散結氣有補養厥陰血脉之功而經不言觀其能退熱者可以仗者實者以行散之藥佐之外以艾灸亦漸取效

○治血少馬刀瘰癧瘡吐泄以四物湯倍酒炒芍藥牡蠣粉陳皮柴胡甘草黃連玄參炒神麴桑椹膏

○石香程氏曰瘰癧之証內經謂之結核者是也結核有大小如大豆銀杏連串而生者形大如馬刀者謂之馬刀瘡經別為火類夫火亢之甚必蕪水化制之其核故堅也凡瘰癧之起始生於耳後足陽明少陽二經浸淫于太陽之經漸隨經流注于腋脇手足皆有也治法以火針刺入核中不可透底納蟾酥膏于中外用綠雲膏貼之三日後取去核中稠膿上取去核外薄膜先破初起之核一枚以絕

其源服藥後出者皆愈或不肯收如銀杏者尽皆開了用藥取之其自潰者猶如木菓之腐熟肉雖潰而核猶存故膿水淋漓久難得愈治者用鉄烙燒赤烙去其破核猶存者併肉潰處次用金寶膏龍珠膏等藥追去盡惡之根遂能長肉而愈隨經絡証候服除風熱煎引經之藥以除根本可獲全功也

○蟾酥膏

蟾酥

如大豆許

白丁香

十五枚

寒水石

少

巴豆

五粒

寒食麪

少

右各另研和作一處再研煉蜜為丸如棗豈大每用一丸或二三丸納入針竅中如膿未尽再用數丸以膿尽為度

○綠雲膏

黃連

大黃

黃芩

玄參

黃栢

木鱉子

去壳以上各一錢

右細切用香油一兩同煎焦色去藥入淨松香五兩再煎成膏濾入水中扯拔令金色入鈹再熬放溫入後藥猪膽汁三箇銅綠三錢醋浸一宿綿去粗

右用竹筴帶溫撓勻然後如常攤貼兼治瘡口不乾加乳香浸藥輕粉尤妙

○金寶膏去腐肉不傷良肉新肉

桑柴灰

五碗用沸湯十碗淋汁用草紙一層皮帛二層

穿山甲

二兩煨胖

信砒

二錢

杏仁

七枚去皮

山甲研細

生地黄

二兩

辰砂

一錢

粉霜

另研

射香各半錢

右將灰汁濾澄清下鍋煎濃下甲末候焦乾一半下射香次下粉霜乾及九分下辰砂候成膏下炒石灰末以成塊子即收入小罐子內勿見風

○龍珠膏

龍牙草

五兩

棘束根半兩海藻二錢半蘇木半兩

右細切量水二十碗煎至十二三碗濾去粗又用

桑柴灰

二碗半

石灰

二碗半

蒼耳草

灰二碗半

以草紙二層皮帑二層放羅底次置灰於上用煎湯熱淋取灰汁十碗許澄清入鍋內煎成膏用巴豆霜白丁香石膏射香輕粉磁罐子收貯每用取付核上再付即去旧藥併醫丹上新藥其核即潰而愈根小者但只塗

東垣

藥於根上其核自潰

○救苦化堅湯治瘰癧馬刀瘰癧在耳下或耳後下頸至肩上或入缺盆中乃手足少陽之經分其瘰癧在頰下或至頰車乃陽明之經分受心脾之邪而作也今將二証合而治之

黃芪

一錢護皮毛間腠理虛及活血氣為瘡家之聖藥又實表補元氣之妙劑也

人參

三分補肺氣之藥也如氣短不調及喘者宜加之

炙甘草

半錢能調中和諸藥瀉火益胃氣亦能去瘡中之邪

真漏芦

升麻

各一錢

葛根

半錢此三味俱足陽明本經藥也

連翹

一錢此一味乃十二經瘡中之藥不可無也

牡丹皮

三分去腸胃中留滯宿血

當歸身

三分

生地黄

三分

熟地黄

三分此三味諸經中和血生血涼血藥也

白芍藥

三分如夏月倍之其味酸氣寒能補中益氣之

肉桂

二分大辛熱能散結積陰證瘡瘍須當少用之此

淨索之氣有煩燥者去之

柴胡

八分功同連翹如瘡不在少陽經則去之

黍粘子

三分無睡不用羌活一錢

獨活

防風

錢半

已上三味必問手足太陽証脊痛頭強不可屈伸腰似

昆布

二分其味大鹹若堅硬者宜用荆三稜炮二分

廣木

炮三分此二味若瘡堅硬甚者用之如不甚堅硬

益智

二分如唾多者胃不和也或病人吐沫上食胃中

麥蘖

又錢腹中滯急神曲炒二分食不消化者用之

黃連

三分治煩悶

厚朴

姜制一錢二分如腹脹者加之

黃柏

炒

分如有熱或腿脚無力加之如有煩燥欲去衣者解下
有伏火也便宜加之無則勿用

右件共為細末湯浸蒸餅捏作餅子日乾搗如米粒大
每服三錢白湯送下○如氣不順加橘紅甚者加木香
少許量病人虛實臨時斟酌與之母令藥多妨其飲食
此為大治之法也○如止在陽明分者去柴胡黍粘子
二味餘皆用之○如在少陽分為馬刀挾瘰者去獨活
漏芦升麻葛根更加瞿麥三分○如本人素氣弱其病
勢來時氣盛而不短促者不可考其平素宜作氣盛而
從病變之權也宜加黃芩黃連黃栢知母防已之類視
邪氣在上中下而用之○假令在上焦加黃芩半酒洗
在中焦加黃連半酒洗在下焦則加酒制黃栢知母防
已之類選而用之○如大便不通而滋其邪盛者加酒

制大黃以利之。○如血燥而大便乾燥者加桃仁泥酒
制大黃二味。○如風結燥不行者加麻仁大黃以潤之。
○如風澁而大便不行加煨皂角仁大黃秦朮以利之。
○如脉澁窻身有氣澁而大便不通者加郁李仁大黃
以除風燥也。○如陰寒之病為寒結秘而大便不通以
局方中半硫丸或加炮附子干姜煎水冷服之。○大抵
用藥之法不惟瘡瘍一家諸疾病重人素氣弱者當去
苦寒之藥多加人參黃芪甘草之類瀉火而先補其元
氣餘皆倣此

○柴胡連翹湯治男子婦人馬刀瘡

中桂一分

當歸稍五分 黍粘子

炙甘草

酒黃柏

生地黃絡一

柴胡一

錢半

黃芩

炒

東垣

酒知母

連翹

各一錢半

瞿麥 二錢

右細切作一服水二盞稍熱服

○消腫湯治馬刀瘡

黍粘子

炒

黃連

各五分

當歸稍

甘草

各七分

瓜蒌根

黃芪

各一錢

生黃芩

柴胡

去芦各一錢二分

連翹

二錢

紅花

少許

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗稍熱服

○柴胡通經湯治小兒項側有核堅而不潰名曰馬刀瘡

柴胡

去芦

連翹

當歸稍

生甘草

黃芩

黍粘子

荆三稜

桔梗

各二分

黃連

五分

紅花

少許

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗食後稍熱服忌

東垣

苦藥泄大便

○散腫潰堅湯治馬刀瘡結硬如石或在耳下至缺盆中或有上或脇下皆手足少陽經中及瘰癧遍於頰或至頰車堅而不潰是足陽明經中所出或二証瘡已破流膿水並皆治之

黃芩

八分酒洗半炒半生

草龍膽

酒先炒四錢

瓜蒌根

酒洗

黃柏

酒制炒

知母

酒洗

桔梗

去芦

昆布

酒洗各五分

柴胡

四分

炙甘草

荆三稜

酒洗

廣木

酒拌炒

連翹

各三分

葛根

二分

白芍藥

二分

當歸

稍二分

黃連

升麻

一分

右細切作一服水二盞先浸半日煎至一盞去粗食後稍熱服於臥處伸足在高處頭低垂每含一口作十次

嚥下服畢少頃依常安臥取藥在膈上停蓄故也另攪一料作細末煉蜜為丸如棗豆大每服百餘丸以前藥送下或加海藻五分炒入亦妙以海藻炙甘草此東垣用藥妙處世醫莫曉也
○升陽調經湯治瘰癧瘰癧或至頰車此皆出足陽明胃經中來若瘡深遠隱曲肉底是足少陰腎經中來乃戊脾傷於癸腎是夫傳與妻俱作塊子堅硬大小不等並皆治之或作丸亦可

升麻八分

葛根

草龍膠

用酒四次制炒

黃芩

廣木

荆三稜

三味俱酒制炒

炙甘草

四分

當歸稍

芍藥

各三分

黃柏

酒炒二分

知母

酒炒一錢

一本有黃連

酒洗

連翹

桔梗

各五

生黃芩

四分

右細切作

一服水二盞

先浸半日

煎至一盞

去粗臨臥

稍熱服外另稱十貼之數為細末煉蜜丸如葶苈大每服一百丸服藥時足高去枕仰臥嚙一口作十次嚥之

○連翹散堅湯治耳下或至缺盆或有上生瘡堅硬如石動之無根名曰馬刀瘡從手足少陽經中來也或生兩脇下或已流膿作瘡未破並皆治之

柴胡一錢二分 草龍膽酒制四次 土瓜根酒制炒各一錢

黃芩酒炒二分 當歸酒炒七分 生黃芩 廣木

荆三稜酒炒 連翹 白芍藥各五分 炙甘草三分

黃連酒炒二分 蒼朮米泔浸各二分

右細切作一服外另稱十貼之數為細末煉蜜丸如葶苈大每服百丸煎者用水二盞先浸大半日煎至一

盡去相臨臥稍熱服去枕仰臥每口作十次嚥之
口送下丸藥服畢如常安臥更以後藥塗之

○龍泉散

龍泉粉

炒即磨刀石上粉也

廣木

荆三稜酒洗炒昆布各五錢

右同為細末煎熟水調塗之用此藥去疾尤速

○三聖丸治痰壅神效切藥

丁香

五十粒 斑蝥十箇去翅及頭足炒

射香一錢另研

右為末用鹽豉五十粒湯浸爛研如泥和前藥末丸如

菴豆大每服七丸食前溫酒送下日三服至五七日竟

小便淋瀝是藥之効便如服或小便下如青筋膜之狀

乃病之根也忌濕麪毒食

○立驗大聖散治療瘧劫藥

斑蝥大者三十箇去頭及翅足用糯米一合同炒米黃色去米用斑蝥

白姜蚕一錢去系用炒黑牽牛半生半炒共三錢取頭末一錢

荆芥穗一錢

右為細末每服一錢空心無灰老酒下服此藥須忌魚肉酒醋鹽醬及發風動氣等物止可吃菜蔬白粥且如次早服藥隔夜不吃夜粥黃昏煎川木通湯調下王雪妙靈散二錢重次日五更酒調立驗大聖散一貼如不能飲酒用燈心木通湯調下至日中煮小腹收痛小便澀痛又用燈心湯調下琥珀末一錢或玉屑妙靈散亦可當利惡物從小便中出如蒲萄肉狀中有疑血一點或未下三日後可再服至日中前用六丁神散一服催

生

之必然自下五六日後再催一服以病根除盡為度如
項上有瘰一枚取下惡物十枚則病根如有小腹攻
急室中澁痛之惱不必驚恐過後便自平復無事
○玉屑妙靈散

活石細研為末每服一錢煎川木通湯調下

○六丁神散

苦丁香 六枚或秤半錢重 白丁香 一錢 苦參末 五分

赤小豆 一錢 磨刀泥 青石者佳一名龍泉粉 大斑猫 七箇去頭足炒

白姜蚕 去系梢炒各一錢

右共為細末每服一錢重空心無灰酒調下

瘰癧方法

○破結散治石瘰氣金瘰血瘰肉瘰馬刀瘰癧等証

海藻酒洗淨龍胆草酒洗海蛤粉

通草

具母去心

昆布酒洗淨礬石枯

公羅各三錢今以桑寄生

代

麥麴炒四錢半夏麴二錢

右為細末每服二錢熱酒調食後服忌甘草鯽魚雞肉五辛生菓○有人於項上生腫大如茄子潮熱不食形瘦日久百方不效後得此方去松蘿加真桑寄生一倍服三五日後其瘡軟而散熱退而愈瘰癧數人皆效○南星散治皮膚頸項面上瘤大者如拳小者如栗或軟或硬不痒不痛宜用此藥切不可輒用針灸多致不救

生南星

大者一枚

右細研爛入好醋五七點杵如膏如無生者即以乾者為末醋調如膏先以細針刺患處令氣透却以膏藥攤

見覺痒則頻換貼取效

○瘡者氣血凝滯結聚而成或如桃李或如瓜瓠其名有六曰
骨癰曰脂癰曰膿癰曰血癰曰筋癰曰風癰以其中各有
此物而名之也已上諸癰通用龍珠膏治之

○龍珠膏

方見前療癰條下

○癰宜服十六味流氣飲

方見前療岩條下

○凡癰氣先須斷厚味用海藻一兩黃柏二兩為末置掌中時
時舂之以津唾嚥下待消三分之二止藥

結核方法

○丹溪曰但凡結核在項在臂在身如腫毒不紅不痛不作膿
者多是痰注不散名曰痰核用二陳湯加酒炒大黃連翹

桔梗柴胡煎服

○又方治癰核作痛用二陳湯加連翹川芎皂角刺防風黃芩

書妙 蒼朮煎服

○治耳後頂門各有一核用炒姜蚕酒蒸大黃青代牛膽南星為末蜜丸噙化

疔腫方法

○石香程氏曰疔腫之証皆蓄熱毒之深而成者也近者多見因食災牛疫馬之肉而成此証其形有十三種皆以形而名之耳一曰麻子疔二曰石疔三曰雄疔四曰雌疔五曰火疔六曰爛疔七曰三十六種疔八曰蛇眼疔九曰鹽膚疔十曰水洗疔十一曰刀鐮疔十二曰浮鷗疔十三曰牛拘疔惟三十六種疔最為可畏其狀頭黑浮起形如黑豆四畔大赤色今日生一明日生二後日生三乃至十數在

為可治若滿三十六則為不治之証也夫十三種疔其形狀雖各不同而其所由皆熱毒之甚也治法並急用奪命丹下之去其毒之銳勢次服化毒丸及內托散二活散雄射湯隨証經絡病勢緩急用引經藥斟酌施治如無他証有熱即退熱有腫則退腫如身冷自汗嘔逆燥喘狂喝妄語直視者皆毒氣入內不可治矣如疔已拔去用金銀白芷散加減十宣散調之方獲全安也

今將十三種疔証候開列于後

○一曰麻子疔其狀肉起頭如黍米色稍黑四邊微赤多痒忌食麻子近油衣布衣并入麻田中行

○二曰石疔其狀皮肉相連色如黑豆甚硬刺之不入肉微痛

忌瓦礫磚石之屬

火

○三曰雄疔其狀炮頭黑靨四畔仰炮漿起有水出色黃大如錢孔形高者忌房事

○四曰雌疔其狀瘡稍黃向裏靨亦似炎瘡四面炮漿起心凹色赤如錢孔者忌房室

○五曰火疔其狀如湯大燒灼瘡頭黑靨四邊有煙焰又如赤粟米者忌火燒烙

○六曰爛疔其狀色稍黑有白斑瘡中潰有膿水流出血形大小如匙面者忌沸熱食爛物

○七曰三十六疔其狀頭黑浮起形如黑豆四畔起赤色今日生一明日生二及至十數未滿三十六猶可施治若滿三十六藥所不能治也忌嗔怒蓄積怨恨

○八曰蛇眼疔其狀瘡頭黑皮浮生形如小豎狀似蛇眼大伴

硬忌惡眼人看并嫉妬人見忌毒藥

○九曰鹽膏丁其狀大如匙面四邊皆赤有黑粟粒起大忌食鹽味

○十曰水洗疔其狀大如錢形中如錢孔瘡頭白裏黑膿汁出中硬忌飲漿水忌洗渡河

○十一曰刀鑱疔其狀闊狹如薤葉大長一寸左側肉黑如燒烙忌刺及刀鑱切割鉄刃所傷可以藥治不可亂攻

○十二曰浮漚疔其狀瘡体曲圓少許不合長而狹如薤葉大內黃外黑上處刺之不痛黃處刺之痛

○十三曰牛狗疔其狀肉色炮起拍不破

右十三種疔瘡初起瘡心先痒後痛先寒後熱上定則寒多四肢沉重心驚眼花若大重者則嘔逆嘔逆者難

治其麻子疔一種始末惟痒初錄忌者不得觸犯上上者發作難治其浮漚疔牛拘疔兩種無所禁忌縱不療亦不能殺人其狀寒熱與諸疔不同皆宜將護依法治療禁忌不得觸犯若或觸犯脊強瘡痛極甚不可忍者是也又云疔腫初發時突起如釘故謂之疔令人惡心惡寒四肢強痛一日瘡變為焦黑色腫大光起根硬刺之不瘡痛皆其候也在手足頭面胞背骨節間最急其餘處則可治毒入腹則煩悶恍惚似醉如此者三二日間死矣皆不可不速治也

○返魂丹經云汗之則瘡愈必用此藥汗之

乳香

沒藥

辰砂

雄黃

各一錢半

輕粉

片腦

射香

各五分

海羊即蝸牛也

不拘多少

蟾酥

青代

粉草

朋砂各一錢

右為細末用海羊搗膏為丸如雞丸加酒麪糊些少丸如彈子大每服一丸煎生葱頭二三箇細嚼嚥下疔腫及癰腫毒氣入臍者得微汗即解○一方加銅綠寒水石輕粉枯礬各一錢重

按上藥皆非發汗之藥蓋能解毒又能追逐毒氣從腠理為汗也

○拔疔法以黑牯牛牽於石塔上必撒糞候糞上生菌取焙乾與稀發草葉并分為細末先用竹筒兩頭去節一頭解十字路將不解頭套在疔上以線緊縛竹筒陷入肉內為度以前藥末一匙滴水和之放於筒內少時藥滾起則疔自拔起若一次未效漸加度数其疔必拔也

○奪命丹

巴豆時

一兩去壳醋煮一伏

黃丹三錢

硃砂

雄黃各三錢

乳香

鬱金各五錢

大黃一兩

輕粉

二十兩蟾酥半錢或

飛羅麝

三兩

右為細末蠟水糊為丸如藁豈大隨身年分虛實加減丸數服之以下其毒如無奪命丹雄黃九代之亦效

○雄黃丸

雄黃

鬱金

各一錢

巴豆

十四枚去壳

射香

許少

皂角

全蝎

各一錢

右為細末滴水為丸如藁豈大每服二十九丸清茶送下亦看大小虛實斟酌加減丸數

○化毒丸

片腦

射香

各五分

硃砂

硃砂

雄黃各二錢

輕粉十兩

蟾蜍二十枚

右為細末新取蟾酥為丸如菜豈大每用一丸放於舌

上取涎而愈

○獨蟾丸

脾取蟾酥法

蝦蟇一本

拿取活蟾

即大壯蝦蟇通身有轔轔者名癩疣麻又各風雞大者重五六兩不拘幾箇

捉住後部以大梟葉或油卑紙包掩其頭用鉄釘一箇

括取眉間白汁澣於葉上凝結如濕真粉就丸如菜豈

大一蟾或作一丸多者作二丸懸當風處陰乾如患疔

腫者即以一二丸置舌尖上仰臥片時其苦水滴口就

以此水熱下或以鉗鍼刺開疔腫頭上納藥一丸於中

外以薄皮紙貼護之勿令藥脫落背癰及一切癰腫初

起時亦可依此法治之神效

已土取蟾酥法切勿防戕入眼即害

○雄射湯解疔毒如神凡解毒不可無雄黃硃砂

雄黃

另研

硃砂

另研各一錢

真桑葉粉

二錢

射香

另研

乳香

另研各一錢

白芷

茜草根

地丁草

各二錢

牡蠣

姜蚕

牛旁子

大黃

金銀花

青木香

梔子

荊芥穗

朴硝

甘草

各一錢 胡桃二箇去

右以白芷以後一十四味細切用無灰酒一碗浸少時
搗細又加水一碗同煎至一碗去粗及濁脚入前雄黃
等五味調勻作一服更審患處經絡分野依東垣引經
瀉火藥加之尤妙欲利倍加大黃朴硝二味臨後下○
茜草即過山龍地疔即太薊也
一云剪刀草開黃花者
名紫花地疔

○二活散

羌活

獨活

當歸

烏藥

赤芍藥

金銀花

酒洗

連翹

天花粉

甘草節

白芷

各四錢半

紅花

蘇木

荆芥

蟬蛻

乾葛 各三錢

檀香 二錢

右為細末每服三錢煎蒼耳湯調下

○取疔散

雄黃

硃砂

蟾酥

信石

各一錢

巴豆

十粒

輕粉

十盞

右將疔四畔用針刺破醋調塗付疔落後用長肉拔毒膏藥貼之

○解毒丸

白芷

十兩

木香

五兩

蘿蔔子

去壳醋浸炒另研細末

貫衆

取新者去皮切斷乾杵末秤四兩

朴硝

四兩硃砂一錢六分

京墨

八錢各另研

右和勻糯米糊丸如龍眼大青代為衣陰乾每服一九

無灰酒磨化下

○賀藍先生解毒丸解毒及山嵐瘴氣火牛馬猪羊肉毒魚腥麪菜毒暑熱濕毒傷寒濕毒小兒斑疹喉痺急証紅赤癰腫及諸般無名腫毒

黃柏

貫衆

茯苓

藍根

葛根

生地黄

雄黑豆

甘草

滑石

宿砂

陰地蕨

波苒子三兩

益智

大黃

寒水石

紫河車即金線重

馬勃

草龍胆

姜蚕

百藥煎

山枝子

各一兩

右為細末煉蜜丸每一兩分作十丸細嚼新汲水送下

小兒驚風渡苛汁下蜜水浸蒸餅為丸亦可或加黃連

白芷

○萬病解毒丸

射干

文蛤

即五倍子

杏仁

石膏

續隨子

去壳

蟬冰

即金線

土硫

大戟

山豆根

山茨菰

白藥子

大黃

酒蒸各二兩

射香

青代

威靈仙

白芷

各一兩

黃連

風化硝

各半兩

右為末糯米糊為丸如彈子大青代活石細研為衣陰

乾此藥解一切毒蠱毒鼠莽毒河豚毒魚毒菌毒疫死
牛馬肉毒喉痺骨鯁竹木刺毒並用急流水磨下煎
發背疔腫瘡瘍毒蛇犬咬蜈蚣蜂蝎螫毒刀斧湯火傷
並用井花水磨下併塗傷處婦人鬼胎惡氣積塊虫積
心胃痞滿肚腹膨脹並用好酒磨下

○千金漏芦湯治疔腫神効

漏芦

連翹

黃芩

白欬

枳壳

升麻

麻黃

去根節

朴硝

各一兩另

大黃

地丁

金銀花

各半

右除朴硝外為細末後入硝和勻每服三錢水一盞生
姜三片薄荷三葉煎至七分空心溫服利下惡物止藥

○取疔腫方

青木香根

錢五木香

雄黃

甘草各一錢

右為末湯調下以利去毒氣四五行即愈

○破毒散

信石

礞石

黃丹

雄黃

乳香

各一字

班貓

五箇去

射香

少許

右為末取新蟾酥和丸如菰豆大以鉞針破開疔頭納藥一丸在內外以膏藥護之如無蟾酥加麝糊些少

○灸法以大蒜爛搗成膏塗瘡四圍留瘡頂以艾炷灸之以爆為度如不爆稍難愈宜多灸百餘壯無不愈者

○祖傳經驗秘方治食炙牛馬肉成疔腫欲死者以柏油木葉搗絞取其汁一二碗頓服之得大瀉毒氣而愈如冬月無葉時取嫩根研水服之亦效未利再服以利為度

諸瘡方法

○活魂丹治一切惡瘡大有神效

血竭

乳香

沒藥

銅綠

枯白礬

黃丹

穿山甲

煨胖

錢輕粉

蟾酥

各五分

射香

少許

右為細末用蝸牛搗膏為丸如菽豆大每服一丸重者

二丸又用葱白一寸嚼爛裹藥熱酒送下食前服

○又方用真姜蠶蟬蛻二味等分為末香油調付拔疔効

○治諸般惡瘡

經霜芭蕉葉為末香油調付先用忍冬藤葱椒蒼耳草煎

湯洗瘡淨挹乾付藥外以油紙掩之

又方治諸般惡瘡用松木土白蟻泥黃丹各等分炒黑香油

調付用油紙夾上日易後用龍骨沒藥歛瘡口收肉

○又方治惡瘡用黃丹入香油煎入朴硝抹之

○天泡瘡服防風通聖散及用炒黃柏蜜調付之後肚皮上起者裏熱發外還用通聖散藥炒

○又方治天泡瘡用野菊花束木根煎湯洗黃柏滑石末付

○治脚上沙瘡清水出者用紫燕窠泥畧炒黃柏二味共為末香油調付

○治臙瘡用白膠香一兩黃柏石膏各一兩青代五錢龍骨半錢為末香油調付

○又治臙瘡方以香油一兩入胎髮如梅大煎焦煇去粗入白膠香黃蠟各一兩煇化入生龍骨赤石脂血竭炒各一兩攪勻候冷磁器盛捏作薄片貼瘡上外以竹箬包之三日

後毒過藥再貼以活血藥煎湯洗之

○又治臙瘡方用箭筈剪去兩頭以黃栢灰汁令稠和白膠香草麻子同搗成膏攤筈糙面折縛光面貼之先以清茶放溫洗挹乾貼之

○又方治外臙脚瘡用電心黃土研極細入黃栢赤石脂黃丹各半兩輕粉乳香沒藥各一錢細研和勻以清油調如膏以油絹攤藥將絹面貼於瘡上外以油紙掩之札縛定縱痒不可開視數日後未愈再換藥緊縛直待結痂去藥先必以茶清洗瘡淨付藥

○桃花散治一切瘡生肌藥

白芨

白欬

黃栢

黃連

乳香另研

射香另研

黃丹各等分

右為細末摻於瘡上二三日生肌平滿如故

○治火燒及湯泡瘡用經霜桑葉焙乾燒存性為細末香油調付或乾付二三日結痂平復

○又方治火燒湯泡瘡時取黃蜀葵花以香油浸之其花日漸烱拉油中以此油付瘡即愈或只收花焙乾為末香油調付亦妙

○下疳瘡用青代海蛤粉蜜陀僧黃連為末付之○又方以雞內金燒存性為末付之

○又方治下疳瘡用鳳凰退燒存性研極細香油調付外看瘡大小剪壳中白膜貼之須靜坐一日不動即結痂矣

○頭瘡用猪油二錢拌生雄黃水銀各二錢五分和勻付之

○金絲瘡其狀如繩線巨細不一上下行至心即死可於瘡頭

日截經刺之以出血後嚼萍草根付之立愈

○手疔瘡用皂角枯礬輕粉黃連黃柏為末付之

○砂瘡用掃地藤燒灰付之

○諸瘡痛不可忍者用苦寒藥可施於貧血厚者若血氣薄者宜於補中益氣湯中加苦寒藥也若血熱之人瘡痛宜四物湯加黃芩鼠粘子連翹在下加黃柏若肥人濕熱瘡痛宜防風羌活荆芥白芷蓋風能勝濕故也

○疥瘡併馬疥瘡用馬鞭草不犯鉄器搗取自然汁半盞飲尽十日內愈神效

○白腐風癬以小麥攤石上以鉄器燒紅壓出油搽之立效

○治風癬疥瘡用梓樹葉木綿子羯羊屎鼠屎盆漚付之

○治癬瘡用浮萍末一两蒼耳子蒼朮各二两苦參一两半香

附二錢半黃芩五錢水煎洗之

○身上雲痒用四物湯加黃芩煎調浮萍末一錢服

○又方治通身痒用凌霄花為末酒調服一錢

○秘傳一擦光治疥瘡及婦人陰蝕瘡漆瘡天火丹諸般惡瘡

神效

蛇床子

苦參

蕪荑各一兩 雄黃半兩

枯凡二錢

硫黃五錢

輕粉二錢

樟腦二錢

大風子

五錢 川椒五錢

右為細末生猪油調付

○又方治証如前兼小兒癩頭瘡治之

蛇床子

一兩 雄黃五錢

硫黃一兩

枯凡二兩

大風子

半兩 川椒半兩

黃柏一兩

輕粉二錢另并

已上諸法皆試驗者

外科精要

東垣

牛皮岸 薰牛虎狸岸也如無以香妒岸代之一兩

黃丹 一兩

右為細末生猪油調付

○凡先哲治癰疽要方俱採撫于後以備選用

○五香連翹湯治癰疽未成膿者服之可散但當看時令及資

稟加減用之

乳香

木香

沉香

丁香

連翹

射干

升麻

木通

桑寄生

射香

獨活

大黃 各等分

右細切每服三錢水一大盞煎七分去粗溫服

○內托復煎散托裏健胃

地骨皮

黃芩

茯苓

芍藥

人參

黃芪

白朮

桂心

甘草

防己

當歸

各半兩

防風

一兩

蒼朮

半斤

右細切先以蒼朮用水五升煎至三升去朮入前十二味再煎至三四盞取清汁作三四次終日飲之又煎蒼朮粗如前再煎諸藥粗服之

○白芷升麻湯治手陽明經分臂上生癰左右寸部脉皆短得之俱弦按之洪緩有力此得之八風之變者

白芷

一錢半

升麻

桔梗

各一錢

甘草

炙半錢

黃芪

四錢

酒黃芩

四錢

生黃芩

三錢

紅花

五分

右細切分二服水酒各一盞煎至一盞溫服

○托裏散治一切惡瘍發背疔腫便毒胎發脉洪數弦實腫甚

將作膿者三服消尽

大黃

牡蠣

瓜蒌根

皂角刺

朴硝

連翹

各六分

金銀花

當歸 各二錢

赤芍藥

黃芩

各四分

右細切作一服水酒各一盞煎至一盞四分服

○又托裏散

黃芪

當歸

金銀花

甘草 各等分

右細切每服一两酒水合煎更詳部位各加引經藥尤

妙

○烏金散治癰疽疔腫時毒附骨疽諸惡瘡等証若瘡黑陷如

石堅四肢冷脉細或時昏冒譫語循衣煩渴危篤服此汗

之即瘡起

瘡瘍集

瘡瘍集

蒼耳頭

五月五日午時收採

草烏頭

火麻頭

大長

木賊

去節

蝦蟇頭

梓皮節

酢炙

麻黃

去根節

合

右晒乾各等分同入磁器內鹽泥固濟烈火煨從早至申時如黑煤色為度研為末每服二錢病重者三錢熱酒調下米汗再進一服如汗已乾却服解毒疎利之藥如修各此藥必選天時清明好日於靜室中合勿令雞犬猫畜及陰人孝子見之

○黃芪六一湯治癰疽發渴

黃芪

六兩

甘草

一兩炙

右細切水煎不拘時服

○一方治一切瘡癰疽發背殊効亦能下瘀血

大黃

三錢

甘草

辰砂

血竭

各一錢

精要

右為細末酒調服

○內托護心散

乳香一兩

真桑葉粉

四兩一方用二兩

右為細末每服二三錢煎甘草湯或新汲水調下

集傷寒

○小五香湯

木香

沉香

乳香

藿香

連翹

各二錢射香湯研少

右為細末每服二錢水一盞煎七分溫服

方高

○復元通氣散

當歸

穿山甲

煨肝

川芎

天花粉

炒各一兩

青皮

陳皮

各一兩

大黃

甘草

黑丑

頭末各

東垣

右為紙末每服二錢溫酒調

○金銀白芷散

黃芪

當歸各一錢 枳殼

川芎各五分

甘草一錢

天花粉五分 乳香

沒藥各三分

皂角刺去尖

金銀花各半 防風三分

白芷一錢

右為細末分三服每服水酒各半盞煎連相服

瘡瘍集

○正鉄纏散

貝母去心

白芷

蒼耳草灰

醋拌晒干各二兩

或加龍骨二錢尤妙

右為細末水調或香油調貼瘡上

瘡瘍集

○大鉄纏散

芙蓉

猪卷皮

木鱉子

各四兩

白芷

黃柏

寒水石各二兩

大黃

紫荊皮各一兩

赤豆

白欬各二兩 白芨一兩

防風半兩

貝母二兩

真地青

羌活各一兩

右為細末涼水調園羅四畔如肉脍去白芨白欬加生

地黃地榆用芭焦油調付熱甚者用三消散

○三消散退極熱証赤腫焮開者

朴硝

硝硝

大黃

梔子炒黑色

寒水石

南星各等分

右為末生地黃汁調塗貼芙蓉葉汁調亦可

○雲母膏治一切癰疽瘡癤折傷等証

蜀椒

去目及開口者微炒

白芷

沒藥

赤芍藥

肉桂

當歸

鹽花

蔓蒲

麒麟竭

黃芪

白芨

烏翳

木香

龍胆草

白芨

防風

厚朴

射香

桔梗

柴胡

松脂

人參

蒼朮

黃芩

乳香

附子

茯苓

良姜

合歡皮各五

甘草

雲母各四兩

栝葉

桑白皮

槐枝

柳枝

水銀以絹另包待膏成以手細彈鋪在上

陳皮各二兩

清油四十兩

黃丹二十兩

右除雲母硝石麒麟竭乳香沒藥射香黃丹鹽花八味

另研外余藥並細切入油浸七日文火煎以柳枝不住

手撈候匝沸乃下火沸定又上火如此者三次以藥焦

色為度去粗再熬後入丹與八味末仍不住手以槐柳枝撓滴水中成珠不軟不硬為度磁器收貯候溫將水銀彈上用時先刮去水銀或服或貼隨宜用之其功甚大也

○太乙膏治一切癰疽瘡癤貼之神効亦可內服須詳証經絡作湯使送下

玄參

白芷

當歸

肉桂

大黃

赤芍藥

生地黃

黃丹

真麻油仁

右細切入油浸夏三日冬十日春秋七日文火煎黑色去粗入黃丹再熬以槐柳枝不住手撓滴水中成珠不軟不硬磁器收貯

神異膏治諸般癰腫毒殊效

露蜂房

有蜂房多者佳一兩

玄參

半兩 黃芪 七錢半

金蛇退

半兩用水盪洗淨

杏仁

皮尖一兩去 黃丹 五兩飛

香油

十兩 亂髮 如雞子大一塊无病壯年男子者佳

右先將香油入亂髮熬至髮焦燂以杏仁投入候杏仁黑色用真綿濾出粗丹將油入銚內然

後下黃芪玄參二味文火熬一二時久住火候片時火

力稍息旋入露蜂房蛇退二味以柳枝不住手撓慢火

熬至紫黑色又再用綿濾過去粗入爐中文武火熬下

丹急撓千餘轉滴水中成珠子膏即成矣冬月畧嫩此

夏月畧硬此磁器盛貯隨意攤貼

○萬應青雲膏治者

癰腫未成膿者貼散已成膿者拔毒

膿腹中痞塊上瘡疾貼大椎及身柱其效如神

白松香 一斤去木屑 草麻子 三百粒去壳

杏仁 三百粒去壳 銅青 三兩 乳香 一斤半沒藥 一兩半

輕粉 二錢

右共作一處用鉄槌木砧於日中搗成膏如燥少加香油杵之或用石臼木杵搗亦可用磁器盛緋帛攤貼湯中燉不見火

○一方治背癰附骨疽乳癰及一切癰腫未成膿者發散極效

槐花 一兩炒焦色 胡桃 十箇新鮮不油者連壳燉火煨熟去

右二味於沙盆內研爛如泥熱酒調和粗溫服如能飲酒人多飲愈效一醉後而癰腫散矣

○薤葉散治癰疽發背及一切癰毒等証效如神

豨薟草

其葉長如牛舌其氣如猪臭者小薊根

五瓜龍

即五葉藤生大蔞

右四味各等分細研用酒和勻瀝去粗服一碗得大汗
通身而愈

○又方治諸般癰腫神效已上並祖傳方

新搗天門冬一味約三五兩洗淨入沙盆內研細以好酒
瀝起瀝去粗頻服未效再服一二服必愈

論

內經曰風之傷人也或為寒熱或為熱中或為寒中或為癘
風又曰癘者因榮衛抗傷其氣不清故使其鼻柱壞而色敗
皮膚瘍潰風寒客於脉而不去名曰厲風丹溪曰是受天地
間殺物之風故也然近見病此者原其所由多是熱血得寒
所致或夏月勞甚而入寒泉澡浴或冬月酒後而乃錫冰履
霜及入水取魚由是濕熱鬱于內而不散風寒客于外而不
行內外拂鬱既久而漸成肌內之敗腐矣經所謂熱勝則肉
腐是也大抵此証肺歸重於手足陽明之經蓋手足陽明者
胃與大腸主之脾肺二經之府也脾主肌肉而肺主皮毛乃
府及於藏病也經又曰腸胃為市無物不受無物不包故其

熱毒積于中而形於外耳故治法必先取陽明而後及於太陰亦本而標之之義也又濕熱甚必生風上甚則生虫如腐草為螢之類又治法必先殺其虫瀉其火然後生血涼血祛風導滯降陽升陰皆為治之急務也治雖多門大畧不越乎此也學者詳之

脉法

脉两寸浮而緊

或浮而洪

陽脉浮弦陰脉實大

脉浮緩者易治

洪大而數者難愈

沉實者難愈

脉溢者病在上

脉浮者病在下皆為不治之証也

方法

丹溪方法九五條

丹溪曰大風病是受天地間殺物之風古人謂之厲風者以其酷烈暴悍可畏耳人得之分在上在下氣受之則在上

血受之則在下氣血俱受則在上復在下然皆不外乎陽
明一經陽明者胃與大腸也無物不受治之者須致意看
其疣瘡與瘡上体先見者多者在上也下体先見者多者
在下也在上者以醉仙散取涎血於齒縫中出在下者以
通天再造散取惡物虫積於穀道中出後用防風通聖散
調之更用三稜針於委中出血夫上下同得者甚重自非
鑿者神手病者鉄心罕能免此夫從上或從下以漸而來
者皆是可治之證人見其病勢之緩多忽之以法治之雖
已全愈若不絕味斷慾皆不免再發而終於不救也予治
五人矣其不死者惟一婦人因貧甚無物可食耳余皆三
四年後再發孫真人云嘗治四五百人終無一人免於死
非真人不能治蓋無一人能守禁忌耳其婦於本病外又

服百餘貼加減四物湯半年之上月經行十分安愈

○醉仙散須量入大小重實與之証候重而急者須先以再造散下之候補養得完復與此藥須斷鹽醬醋諸魚掛菓煎炒燒炙等物上可淡粥及淡煮熟時菜雖茹亦不可食惟烏梢蛇菜花蛇淡酒蒸熟食之可以助藥力也

○外科精要為諸瘡立法而不及癰風蓋風為百病之長以其殘害層疊去死不遠一有染此鮮能免者比之瘡瘍治法為難乃不言及夫八方之風起因於八方應其時則物生適其時則殺物人之稟受有殺氣者則感而受之如特虛受物後又因起居飲食男女游成鬱氣二氣積于厥躬脾先受之乃為濕病濕積之久火氣出焉火氣鬱鬱氣濁血

汚一云血熱凝結其氣不清化生諸虫以次傳應臟府必死之病而有

可主之理其始病者胃氣微傷脾主肌肉流行甚緩傳變以漸或可藉醫藥之功而免謂之必死非惟醫不知藥悉是不能禁然可哀也夫

○近見粗工用藥佐以大風子油殊不知此藥性熱有燥痰之功而傷血至有病將愈而先失明者

○宋洞雲云大風有五黑色不治余皆可治至食肝眉落食肺鼻崩食脾声啞食心足底穿膝虛腫食腎耳鳴秋秋耳弦生瘡或痺或痛如針刺狀食身則皮痒如虫行自頭面來為順風自足起者為逆風多因感寒熱與痰濁雜氣而成治法先以雷公散即再造散下之以稀粥養半月勿妄動作勞後以醇仙散中間或吐或利不必怕怯但顯喉頭面腫吞不得下旋出惡水或齒縫中出臭水血絲或言不得或悶

而死難以飲食只以稀粥用管灌入或一句或半月一月面漸白而安重者又與換肌散

○換肌散治大風年深不與者以致眉毛脫落鼻梁崩塌服此藥不踰月取効如神

黑花蛇

白花蛇

皆新黃來者並用酒浸一宿

地龍

去土各三兩

當歸

細辛

白芷

天麻

蔓荊子

威靈仙

荊芥穗

甘菊花

苦參

紫參

沙參

木賊

不灰木

炙甘草

白茯苓

天門冬

赤芍藥

定風草

按本草即天麻也今皆用野天麻即益母草未知可否再宜詳之

何首烏

石菖蒲

胡麻子

草烏頭

去皮脐

蒼木

木并浸去皮

川芎

木鱉子

各兩

右為細末每服五錢溫酒調下酒多為妙

○醉仙散

胡麻子

牛旁子

蔓荊子

枸杞子

四味俱炒紫黑色

白蒺藜

苦參

瓜萎根

防風

各五錢寶鑑前四味

各一兩

右為細末每一兩半入輕粉一錢拌勻每服一錢茶清調下晨午夕各一服後五七日先於牙縫內出臭涎淨身疼痛昏悶如醉後利下膿血惡臭尿為效

○通天再造散

欒金

半兩

皂角刺

生黑大

者去尖

大黃

炮各一兩

白丑

頭末六錢半生半炒

右為末每服五錢日未出時以無灰酒調面東服之當

日必利下惡物或臭膿或虫如虫口黑色乃是多年赤色乃是近者數日後又進一服無虫積乃止

○愈風丹治癘疾手足麻木毛落眉脫遍身瘡疹皮膚痞痒爬之成瘡及一切疥癬風疾皆效

苦參一斤研取頭末四兩土桃蛇一條酒浸二三日去骨取肉日乾

烏梢蛇 白花蛇 各一條並同上制

右爲細末以皂角一斤剉長寸許段無灰酒浸一宿去酒以新水一碗揉取濃汁去粗銀石器內熬膏和前末丸如梧桐子大每服六七十丸煎防風通聖散送下粥飯壓之日三服三日浴以大汗出爲應再三日又浴取大汗三浴乃安浴法見後條

○一法用桃柳桑槐楮五般枝濃煎湯大缸浸坐沒頸一日俟

湯如油安矣。○本草治惡疾遍身生瘡濃煎滓湯浴浸半
日大效此神方也。○又以荊芥穗大黃梔子蔚金地黃杜
仲防風羌活獨活白茯苓等分爲細末以大風子油入熬
蜜丸如梧桐子大每服茶清送下四五十丸一日三服須
守戒三五年日誦觀音千萬聲以攝其心禁其慾乃安也
○一法以苦參五斤好酒三斗漬一月每服一合日三服常與
不絕齋脾既安細末服之亦良尤治癰疹方出圖經陶隱
居以酒漬飲治惡瘡久服輕身日華子以爲殺虫本草除
伏熱養肝膽氣予常以蒼耳葉爲君以此物爲佐更以酒
煮烏鱖魚代補蛇之或缺研細糊丸如梧桐子大每服五
六十丸加至七八十丸熱茶清送下日三服一二月而安
若入紫萍尤捷紫萍多水蛭須寒月於山沼取之淨洗去

已上
湯法

泥罌熬透乾用

○一法治手指彎曲節間痛甚漸至斬落用草麻子去壳黃連
剉如豌豆大各一兩水一升小瓶浸春夏三日秋冬五日
取草麻子破平且時面東以浸藥水服一粒漸加至四五
粒微利不妨忌猪肉魚腥宜茹淡累獲神效

○一法先服加減通聖散大瀉惡毒穢積又用三稜針看肉黑
處及委中紫脉刺出死血不可令出太過恐損真氣後服
神仙紫花丸

防風

五錢

連翹

三錢

川芎

五錢

白芍藥

三錢

當歸

三錢

酒洗

二錢

荆芥穗

五錢

麻黃

三錢

去根

梔子

三錢

去壳

五錢

枳殼

去核

五錢

石膏

五錢

甘草

三錢

滑石

三錢

黃芩

三錢

去核

紫胡

五錢

方錄

黃連五錢 黃柏三錢 生地黃三錢 羌活五錢

熟地黃三錢半 酒 錦大黃六兩 芒硝一兩

皂角刺一兩 獨生者去尖

右細切分八服每服用水一碗半煎至一碗空心服日進二服五六日後又進二服待補養完又行二次然後服後丸藥

○神仙紫卷丸治癰風及諸般惡瘡風瘡其效如神但要藥真無有不效者輕者一料可愈重者二三料除根

白花蛇一具 出新黃州黑質白紋龍頭虎口背上二十箇方勝花尾尖有一佛指甲新鮮者佳兩半 者不堪用去頭尾各四五寸許一兩為率連皮骨用一

何首烏 荆芥穗 威靈仙各四錢 麻黃連根節二錢

胡麻子一錢 蛇床子二錢

右六味細切同蛇用無灰酒一大碗浸一宿去蛇皮骨
通晒乾仍還原酒內再浸再晒酒盡為度待晒極乾共
為細末另包

木香

沉香

各二錢 人參一兩

當歸 七錢半

胡

明天麻

猪牙皂角

各五錢

射香

一錢半 重者

倍之

乳香

沒藥

各一錢

明雄黃

辰砂

各五分 大塊者佳

肉苳蔻

一枚

定風草

二錢半 即天麻

還瞳子

即草决明一兩

右射至辰砂五味各另研極細不見火其餘草木味亦
另研細羅過連前五味和勻另包

防風

去芦

羌活

甘草

細辛

川芎

獨活

蒼朮

和泔浸一宿

枇杷葉

去筋毛

白芍藥

白疾藜

金銀花

五加皮

香白芷

苦參

各五錢

胡麻子

白附子

米泔浸

麻黃

川牛膝

草烏頭

米泔浸

川烏

米泔浸

石膏

各二錢半

右為細末另包

按合法治用大風子三斤

新辦者佳發油黃色者不堪用去壳

以磁罐一箇盛

之少入無灰酒以皮紙竹箬重

上

包口勿令泄氣頻滾湯

中勿令沒罐口外以物蓋鍋口密封固文武火蒸候黑爛

為度新無香滓成油分作三分每一分入第二號藥八錢

重第一號藥六錢重第三號藥一兩五錢重和勻加糯米

飯搗極膠粘如梧桐子大晒乾勿見火每服二十九漸加

至五十九雞鳴時午時臨臥時各一服茶清送下忌房

丹

芳醖酸酒醋糟淹猪羊雞馬驢肉魚腥煎燂水菓五辛姜
椒大料辛辣熱物蕎麥羹宜之類若不忘口斷慾則藥無
功雖愈再發其余肉味病愈後一年可食但猪羊雞肉終
身用忌此法乃治癰之神方也不可輕忽

跌傷方法

○治跌撲損傷用蘇木以活血黃連以降火白朮以和中重便
煎為妙在下者可下瘀血但先須補托在上者宜飲悲汁
或和粥吃切不可飲冷水蓋血得寒則凝但一絲血入心
即死

○骨損者用古文錢五分醋浸乳香浸藥各一錢酒研服或用
接骨散

○元戒接骨丹

沒藥

乳香

當歸

川椒

自然銅

火版醋淬

赤芍藥

骨碎補

酒炙

敗龜板

酥炙

虎胫骨

白芷

千金藤

即和杏仁已上各等

右為細末化蠟五錢九如彈子大每服一九好酒半升
化開煎用向東南柳枝撓散熱服○一方加龍骨川芎

○凡治損傷妙在補氣血倍工不知惟在速効多用自然銅以
校骨然此藥必煨煉方可服新出火者其火毒與金毒相
扇挾香熱藥毒雖有接骨之功其燥散之禍甚於刀劍戒
之戒之

○治金瘡急以石灰厚傳裹之如瘡深不宜速合者加滑石末
付之

○又方老杉木皮為末付之

河東

大成方

問河

○凡跌撲損傷腰痛者知在瘀血用桃仁承氣湯加蘇木紅花

下之

○當歸導滯湯治跌撲損傷瘀滯不行等証

大黃

當歸

在上用頭在中用身在上下用尾通身痛者全用酒浸洗焙干

右細切等分每服一兩重酒煎服

○雞鳴散治從高墜下及木石所壓一切損傷瘀血凝積痛不

可忍並以此藥推陳致新

大黃一兩

杏仁

二十一粒去皮尖另研

右研為末酒大碗煎七分慮去粗雞鳴時服至曉必取

下瘀血即愈

愚按此方用杏仁而不用桃仁者蓋跌打血入氣分故用杏仁以行氣中之血矣

○沒藥乳香散治跌撲損傷痛不可忍

白朮

炒五兩

當歸

焙

甘草

炙

白芷

沒藥

另研各一兩半

肉桂

去麝香

乳香 另研各一兩

右為末和勻再研極細每服二錢溫酒調下

○杖丹膏藥方治受杖責後如死血癰腫宜先刺出血然後以此膏貼之三四日平復或早失調理成癰者貼之即散及治諸般癰疽瘡癤毒已潰未潰貼之無不神效

甘草

肉桂

蛇蛻

蟬蛻

露蜂房

連翹

白芷

白炭

白欬

白朮

蒼朮

人參

玄參

苦參

芍藥

南星

升麻

厚朴

梔子

百合

金銀花

天花粉

川歸

川芎

穿山甲

炙

羌活

獨活

黃連

黃芩

黃栢

大黃

生地黄

紅朮

蘇木

紫胡

鱉甲酥炙末

青木香

何首烏

防風

荆芥穗

藿香

雲母石

花蕊石

各一兩 亂髮壯年無病男者一

塊

乾蟾一隻即風雞

鳳凰胎

一隻即亮中不轉頭雞也陰干用

桃柳桑枝

各五莖

右各細切用香油六斤重浸藥三五日入鍋內熬色去粗入黃丹三斤別用槐柳枝不住手撓膏成候溫入後

藥末

乳香

沒藥

龍骨

各一兩 輕粉五錢

血竭

一兩

射香

二錢

右撓勻磁器收貯臨期看瘡大小攤貼

驗錄

○沒藥散治刀箭傷止血佳痛

定粉

風化石灰

各一兩

枯白礬

二錢另

乳香

五分另研

沒藥

一字另研

右各研為細末同和勻再研乾摻之

破傷風 六十二

論

內經曰風者百病之始也清淨則腠理閉拒雖有大風苛毒而弗能為害也若夫破傷風証因事擊破皮肉往往視為尋常殊不知風邪乘虛而客襲之漸而變為惡候又諸醫久不合口風邪亦能內襲或用湯淋洗或著艾焚炙其湯火之毒氣亦與破傷風邪無異其為証也皆能傳蟠經絡燒燥真氣是以寒熱間作甚則口噤目斜身軀強直如角弓反張之狀死在旦夕誠可哀憫治之之法當同傷寒處治因其有在表在裏半表半裏三者之不同故不離乎汗下和三法也是故在表汗之在裏者下之在表裏之間者宜和緩之又不可過其法也閭閻野人多不識此証殺人之易早不求醫治療而

袖手待斃矣

脉法

表脉浮而無力太陽也

脉長有力陽明也

脉浮而弦小者少陽也

河間曰太陽宜汗陽明宜下少陽宜和鮮若能明此三法而治

不中病者未之有也

愚按河間先生論破傷風脉証詳明甚矣何其但云三陽而不及於三陰蓋風邪在於三陽之經便宜按法早治而愈若得傳入三陰其証已危或腹滿自利口躁咽乾舌卷如縮皆無可生之証故置

而弗論也

方法

丹溪曰破傷風同傷寒壞証治看有何經而用本經藥驅逐

之誤則殺人劉河間有法有方宜選而用之

河間

○卷活防風湯治破傷風邪初傳在表

羌活

防風

川芎

桑本

當歸

芍藥

甘草

地榆

細辛

各五分

右細切作一服水一盞半煎至一盞去粗熱服不拘時
候量繁慢加減用之熱則加大黃一錢大便秘只加大
黃五分緩緩令通

○白朮防風湯若服前藥太過令自汗者宜服此藥

白朮 一錢

防風 二錢

黃芪 一錢半

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服不拘時藏府
和而有自汗可用此藥破傷風藏府秘小便赤自汗不
止者因服熱藥汗出不休者故知無寒也宜速下之先
用小湯黃湯二三服後用大芍黃湯下之

問河
○小芎黃湯

川芎 二錢

黃芩 一錢半
甘草 五錢

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服不拘時候三服即止再用後藥

問河
○大芎黃湯

川芎 一錢

羌活

黃芩

大黃 各一錢半

右細切作一服水一盞溫服宜和為度

問河
○發表雄黃散

雄黃 一錢

防風 二錢

草烏 一錢

右為細末每服一字溫酒調下裏和至愈可服裏未和不可服

問河
○大蜈蚣散

蜈蚣黃赤足各一條江漂五錢即魚鱗鯨

左蟠龍五錢炒烟尽為度即即書

右為細末每服一錢清酒調下治法依前用裏和至愈可服但有裏証不可服次當下之用蜈蚣散四錢巴豆霜半錢飯丸而煮豈大每服一丸漸加至六七丸清酒調蜈蚣散少許送下宜利為度內外風去可服羌活湯緩緩而治不拘時候服之羌活湯者治半在表半在裏之藥也

○大羌活湯

羌活

菊花

麻黃

川芎

石膏

防風

前胡

黃芩

細辛

甘草

枳殼

白茯苓

蔓荊子各四分 薄荷

白芷各二分

右細切作一服入生姜五片水一盞半煎至一盞稍乾服不拘時日進二服

○防風湯治破傷風同傷寒表証未傳入裏宜服此藥

防風

羌活

獨活

川芎各一錢二分

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服

○小蜈蚣散

蜈蚣

黃赤足各一條

江漂三錢

右爲細末用防風湯調下如前藥解表不已者轉入裏當服左龍丸漸上看大便硬軟如巴豆霜服之

○左龍丸

左蟠龍

五錢

白僵蚕

五錢

江漂

兩

雄黃

一錢

右同爲細末飲丸如梧桐子大每服十五丸溫酒下如裏証不已當於左龍丸末一半內入巴豆霜半錢飯丸如梧桐子大每服一丸漸加至以利爲度若利後更服後藥若搐搦不已亦宜服後藥羗活湯也

○小羗活湯

羗活

獨活

防風

地榆各一錢二

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服如有熱加黃芩有痰加半夏若病日久氣血漸虛邪氣入胃全在養血爲度

○養血當歸地黃湯

當歸

地黃

芍藥

川芎

藜蘆

防風

白芷

各一錢細辛半錢

問河

○雄黃散治表藥

右細切作一服水一盞半煎至一盞服

南星

半夏五錢

天麻五錢

雄黃二錢半

右為細末每服一錢溫酒調下如有涎於此藥中加大黃為下藥

問河

○地榆防風散治破傷風中風半在表半在裏頭微汗身無汗不可發汗宜以表裏治之

地榆

防風

地丁香

馬薺薺各等分

右為細末每服三錢溫米飲調下

問河

○白木湯治破傷風大汗不止筋牽手足搖弱

白木

葛根各二錢升麻

黃芩各二錢

芍藥四錢

甘草半錢

同問

○江鱧丸治破傷風驚而發搐藏府秘泄知病在裏宜以此藥

下之

江鱧

剉炒

野鴿糞

炒

雄黃一錢

白僵蚕

半兩炒

蜈蚣

黃赤足一對

天麻

半錢

右為細末分作三分用二分以燒飯為丸如梧桐子大
硃砂為衣用一分入巴菰霜一錢同和亦以燒飯為丸
如梧桐子大不用硃砂為衣每服以前硃砂衣丸二
十九已菰霜丸一九第二服二九加至利為度再單服
硃砂衣丸于病愈止藥

○祖傳經驗秘方治初破傷風發熱紅腫風邪將欲傳播經絡

而未入深者

杏仁研細

羅白麴各等分

右以二味和勻用新汲水調和如膏付傷處腫消熱退

○一方治破傷風發熱用蟬蛻炒研細酒調一錢七服效

○安文陳珎四兄因勸聞毆眉稜骨被打破得破傷風頭面大

腫發熱尋適在彼家以九味羌活湯服取汗外用杏仁搗

爛入白麴少許新汲水調付瘡上腫消熱退而愈後以此

法治若千人皆驗

○附翹花瘡

一名綿花瘡一名廣東瘡

川芎

天花

分各五錢

輕粉

二錢

黃

辰砂

一分半

各

射香

五分

右為細末熬餅丸如菴荳大每

服八分

溫酒

下日三服

○一方無川芎天花粉二味亦效

新編醫學正傳之六終